

ACTAN CD SAVAL**Fluoxetina***Antidepresivo*

- 30 comp.disp.

COMPOSICIÓN

ACTAN cápsulas.

Cada cápsula contiene:

Fluoxetina 20 mg.

ACTAN CD comprimidos dispersables ranurados.

Cada comprimido dispersable contiene:

Fluoxetina 20 mg.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

Fluoxetina es un inhibidor altamente selectivo de la recaptación de serotonina al igual que su metabolito principal: norfluoxetina. Esto produce un aumento de serotonina en el espacio presináptico, lo que se traduce en numerosos cambios funcionales asociados con el aumento de la transmisión serotoninérgica.

INDICACIONES

Depresión mayor: depresión unipolar, desórdenes obsesivo-compulsivos.

Depresión menor o reactiva.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

La dosis usual es 20 mg diarios (una cápsula o un comprimido dispersable) en una sola toma al desayuno. En caso necesario se pueden administrar hasta 80 mg diarios en una o dos tomas al día (subir progresivamente la dosis en 20 mg cada 3-4 días cuando la respuesta clínica lo requiera). Al ingerir el comprimido disolver en un poco de agua y agitar levemente antes de ingerir. En caso requerido el comprimido también puede ser ingerido sin disolver previamente.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en caso de hipersensibilidad a la droga. En presencia de insuficiencia hepática. La vida media de fluoxetina puede prolongarse, siendo necesario disminuir o espaciar la dosis. No se ha establecido su seguridad durante el embarazo y lactancia. No administrar a pacientes con adenoma prostático y glaucoma.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Precaución en pacientes con terapias concomitantes. En úlcera y parkinson.

REACCIONES ADVERSAS

El perfil de reacciones adversas de fluoxetina es similar al presentado por otros inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Las manifestaciones principales son síntomas gastrointestinales (náuseas), ansiedad, nerviosismo, insomnio, anorexia, sequedad de la boca, disminución de la libido.

INTERACCIONES

Interacción con otras drogas serotoninérgicas, Inhibidores de monoamino oxidasa, drogas que se metabolizan vía enzimas microsomiales, carbamazepina, fenitoína, anticoagulantes.

SOBREDOSIFICACIONES

En caso de sobredosificación, mantener los signos vitales.

ALMACENAJE

Almacenar por debajo de 30°C (cáps.) y 25°C (comp.). Protegido de la luz y la humedad.

PRESENTACIÓN

Estuches con 30 ó 60 cápsulas. Estuche con 30 comprimidos dispersables ranurados.