

**AGITAL 200** © *IMEG*

## **Carbamazepina (ME)**

*Anticonvulsivo*

- Caja x 30 comp. ran.
- Caja x 50 comp. ran.

### **FÓRMULA**

AGITAL 200

Cada comprimido ranurado contiene:

Carbamazepina 200 mg.  
Excipientes c.s.p1 comprimido ranurado

### **ACCIÓN TERAPÉUTICA**

Anticonvulsivo, antineurálgico, estabilizador del humor.

### **PROPIEDADES**

La Carbamazepina es un derivado tricíclico del iminostilbeno. Estructuralmente es similar a fármacos psico-activos como los antidepresivos tricíclicos (imipramina, clopromazina, imaprotolina) y comparte algunas características estructurales con los anticonvulsivos (fenitoina, clonazepam y fenobarbital).

### **INDICACIONES**

Epilepsia, tratamientos de las crisis convulsivas parciales con sintomatología simple o compleja, crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas (gran mal), crisis convulsivas mixtas, anticonvulsivo de primera elección. Neuralgia del trigémino. Síndrome maniaco depresivo como anti-maniaco o como profilaxis de las fases maníacas y depresivas (especialmente en los casos resistentes a la monoterapia con litio o con intolerancia al mismo). Control y profilaxis de los epiSodios de excitación y agresividad en los trastornos esquizofrénicos, esquizoafectivos de personalidad y psico orgánicos.

### **CONTRAINDICACIONES**

Crisis de ausencias atípicas o generalizadas. Crisis atónicas. Crisis convulsivas mioclónicas. Bloqueo aurículo-ventricular. Antecedentes de depresión de la médula ósea. Deberá evaluarse la relación riesgo-beneficio en presencia del embarazo, lactancia, diabetes mellitus, glaucoma, disfunción hepática o renal y reacciones hemáticas diversas causadas por otros medicamentos.

### **REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES**

Reacciones agudas: irritabilidad, estupor, confusión y coma. En tratamientos prolongados: somnolencia, mareos, vértigos, ataxia, disartria, visión borrosa, diplopía, náuseas, vómitos y anorexia.

Raramente bradicardia, respi-

ración dificultosa, rigidez, temblor, alucinaciones visuales, hemorragia o hematomas, fiebre, adenopatías, linfadenopatías y parestesias. Puede aparecer aumento de la frecuencia de crisis convulsivas.

### **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS**

Se tendrá precaución al manejar o conducir maquinarias o realizar trabajos que requiera atención y coordinación. En pacientes diabéticos pueden incrementarse las concentraciones de azúcar en la orina. Los pacientes de edad avanzada pueden ser más sensibles que los jóvenes a la confusión o agitación, bloqueo cardiaco, auriculoventricular o bradicardia. Los efectos leucopénico y trombocitopénicos pueden dar mayor incidencia de infección microbiana, retraso de la cicatrización y hemorragia gingival.

### **PRESENTACIONES**

AGITAL 200

Caja conteniendo 30 comprimidos ranurados