

ALERMID ^{QUIMFA}

Clorhidrato de Fexofenadina

Antihistamínico, Antialérgico

- 60 mg. x 20 comp.
- 120 mg. x 10 comp.

PRESENTACIONES

ALERMID® 60: envase conteniendo 20 comprimidos.

ALERMID® 120: envase conteniendo 10 comprimidos.

ALERMID® 60

FEXOFENADINA 60 mg

FÓRMULA:

Cada comprimido contiene:

Fexofenadina.....60

mg.

Excipientes.....c.

s.p.

ALERMID® 120

FEXOFENADINA 120 mg

FÓRMULA:

Cada comprimido contiene:

Fexofenadina.....120

mg.

Excipientes.....c.

s.p.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antialérgico. Antipruriginoso. Antihistamínico.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Rinitis alérgica estacional en adultos y niños de 12 años de edad y mayores. Los síntomas tratados incluyen estornudos, rinorrea, lagrimeo, congestión ocular y nasal, picazón de nariz, paladar y garganta.

POSOLOGÍA

La dosis recomendada es de 60 mg, dos veces por día en adultos y niños de 12 años de edad y mayores. Se recomienda una dosis de 60 mg una vez por día, como dosis inicial, en pacientes con función renal disminuida. La dosis de 120 mg es de una vez por día en adultos y niños de 12 años de edad y mayores.

CONTRAINDICACIONES

Está contraindicada la administración en pacientes con hipersensibilidad conocida a cualquiera de sus componentes.

REACCIONES ADVERSAS Y EFECTOS COLATERALES

Los efectos adversos incluyen náuseas, dismenorrea, somnolencia, dispepsia, fatiga, cefaleas e irritación de la garganta.

ALERMID PLUS ^{QUIMFA}

Clorhidrato de Fexofenadina,

Pseudoefedrina

Descongestivo antialérgico

- 10 comp.

PRESENTACIÓN

Envase conteniendo 10 comprimidos.

FÓRMULA

Cada comprimido contiene:

Fexofenadina.....60

mg.

Pseudoefedrina..120 mg.

Excipientes.....c.

s.p.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antialérgico - Descongestivo.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Para el alivio de síntomas asociados con rinitis alérgica estacional en adultos y en niños de 12 años de edad o mayores. Los síntomas efectivamente tratados incluyen estornudos, rinorrea, picazón nasopalatina o de garganta, picazón, lagrimeo, enrojecimiento de los ojos y congestión nasal.

POSOLOGÍA:

La dosis recomendada es 1 comprimido 2 veces al día para adultos y niños mayores de 12 años de edad. Se recomienda administrar 1 comprimido por día como dosis inicial en pacientes con función renal disminuida. En general, la selección de dosis debe ser cautelosa cuando sea administrada a un paciente mayor (usualmente más bajo). El comprimido debe tragarse entero (no romper ni masticar). No ingerir durante las comidas.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad conocida a cualquiera de sus componentes. Pseudoefedrina: contraindicado en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho; retención urinaria; en pacientes que estén recibiendo terapia con IMAO o que estén dentro de los 14 días de haber suspendido esa terapia. También en pacientes con hipertensión severa o enfermedades de la arteria coronaria y en aquellos pacientes que hayan mostrado hipersensibilidad o idiosincrasia a sus componentes adrenérgicos o a otras drogas de estructura química similar.

REACCIONES ADVERSAS Y EFECTOS COLATERALES:

Dolor de cabeza, insomnio, náuseas, sequedad de boca, dispepsia, irritación de garganta, vértigo, agitación, dolor de espalda, palpitaciones, dolor abdominal. También puede observarse estimulación leve del S.N.C. debido a la Pseudoefedrina, como: excitabilidad, inquietud, vértigo, debilidad o insomnio. Se informaron también náuseas, sequedad de boca, agitación, palpitaciones, palidez.

Director Técnico: Farm. Valeria Peralta de Isasa

Reg. Prof. N° 3.602

Autorizado por D.N.V.S. del M.S.P. y B.S.