

ALGIDOL PLUS FARMICAL**Paracetamol, Guarana***Antifebril / Analgésico*

- Exhib. X 10 blister

FÓRMULA

Paracetamol.....500 mg.
Guarana..... 50 mg.
Excipientes c.s.p.....1 comprimido

INDICACIONES

Síntomas dolorosos y febriles, cefaleas, neuralgias, artralgias, cuadros gripales, decaimientos físicos y psíquicos, dolores musculares, estados dolorosos post-

traumático y post-operatorio. Procesos dolorosos de la esfera buco dental. Odontopatías que cursan con procesos febriles.

POSOLOGÍA Y FORMA DE USO

Ingerir cada comprimido con abundante líquido, cada 6 a 8 horas.

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES

El Algídol Plus por lo general es bien tolerado. No se ha descrito producción de irritación gástrica ni capacidad ulcerogénica.

CONTRAINDICACIONES

Antecedentes de hipersensibilidad al fármaco.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

En la insuficiencia hepática o renal se deberá administrar con precaución.

En tratamientos continuos y prolongados de más de 30 días de duración el médico deberá vigilar el cuadro hemático.

INTERACCIONES MEDICAMENTOS

A largo plazo y a dosis altas, puede potenciar la acción de los anticoagulantes orales.