

ANTIAX SAVAL**Magaldrato, simeticona***Antiácido local c/ antiflatulento*

- Caja x 24 comp.
- Caja x 60 comp. mast.
- Susp. oral fco. x 180 mL.
- Susp. oral fco. x 2000 mL.

COMPOSICIÓN

Cada comprimido o cada 5 mL de suspensión contiene:

Magaldrate 480 mg.

Simeticona 100 mg.

Propiedades Farmacológicas

La asociación de magaldrate (antiácido) y simeticona (antiflatulento) produce rápido y efectivo alivio de los síntomas gastrointestinales asociados con acidez.

INDICACIONES

Hiperacidez de diverso origen; síntomas dispépticos que acompañan a la hiperacidez: flatulencia, distensión abdominal. Distensión y dolores abdomina-

les post operatorios.

POSOLOGÍA Y**ADMINISTRACIÓN**

1-2 comprimidos masticables ó

1-2 cucharadas de suspensión después de cada comida.

CONTRAINDICACIONES

Insuficiencia renal grave.

PRECAUCIONES Y**ADVERTENCIAS**

Frente a cuadros definidos de úlcera gastroduodenal.

REACCIONES ADVERSAS

No se han descrito.

INTERACCIONES

No administrar concomitantemente con tetraciclinas, anticolinérgicos y codeína.

Sobredosificaciones

Diarrea, constipación.

ALMACENAJE

Almacenar por debajo de 30°C. Protegido de la luz y la humedad (comprimidos).

Almacenar por debajo de 30°C. No refrigerar (suspensión).

PRESENTACIÓN

Envases con 24 y 60 comprimidos.

Frascos con 180 mL de suspensión.

Frascos con 200 mL de suspensión.

