

Albendazol

Antiparasitario de amplio espectro

- 1 pack x 5 ampo. Bebibles de 10 mL.

CONTRAINDICACIONES:

Disfunción hepática tal como en la cirrosis hepática. Debido a que se metaboliza extensamente en el hígado, la hemodinámica intrahepática producida por las alteraciones de la estructura del hígado en la cirrosis hepática puede alterar la tasa de aclaramiento hepático haciendo que se acumule el Albendazol y aumente los efectos secundarios. Hipersensibilidad al Albendazol.

PRECAUCIONES Y**ADVERTENCIAS:**

Se han reportado raras fatalidades con el uso de Albendazol debido a granulocitopenia o pancitopenia. Deben realizarse controles hemáticos al principio de cada ciclo de terapia de 28 días., y cada dos semanas mientras permanezca bajo tratamiento con Albendazol.

En la mujer con potencial de embarazo, el Albendazol se administrará a los 3 días de inicio de la menstruación y se aconsejará tener precauciones anticonceptivas para evitar el embarazo al menos un mes posterior al tratamiento.

Antes de iniciar la terapia con Albendazol en los pacientes con

cisticercosis, se debe realizar un fondo de ojo para descartar lesiones retinales (aunque son raras), puesto que el Albendazol puede inducir cambios en las lesiones retinales.

Durante la primer semana de tratamiento con Albendazol, en los pacientes con neurocisticercosis deben administrarse concomitantemente corticosteroides, orales o intravenosos y anticonvulsivantes, para prevenir las manifestaciones de irritación cortical secundaria a hipertensión intracraneana.

