

**AS-FARMIL** AS-FARM

### **Hidroclorotiazida**

*Diurético, antihipertensivo*

- Caja x 30 comp.

#### **CONTRAINDICACIONES:**

En pacientes con hipersensibilidad conocida al fármaco o a derivados de la sulfonamida. Anuria. Deshidratación severa. Coma hepático. No se ha establecido la seguridad y eficacia en uso pediátrico.

#### **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:**

Se utiliza con precaución en pacientes con enfermedad renal avanzada. La hipopotase-mia inducida por la hidrocloro-tiazida puede predisponer a los pacientes que toman digoxina a toxicidad por la digital. En tratamientos prolongados controlar niveles séricos de Sodio y Potasio. La hidroclorotiazida se

distribuye en la leche materna; no se ha establecido la seguridad y eficacia en pacientes que están lactando- probablemente seguro a dosis habituales- (el médico determinara dosis y uso en estos casos). Categoría en el embarazo: B: uso aceptado. En hipertensión inducida por el embarazo es categoría D: hay evidencia de riesgo fetal-utilizar como último recurso. Pacientes de edad avanzada y aquellos debilitados: se necesitara observación estrecha y pueden requerir dosis reducidas. La terapéutica con hidroclorotiazida puede alterar los valores séricos de los electrolitos y puede aumentar las cifras séricas de urato, glucosa, colesterol, pudiendo también interferir con pruebas para la función para tiroidea y se suspenderá antes de estas pruebas.

