

Montelukast sódico

- 4 mg. x 30 comp. masticable
- 10 mg. x 30 comp.
- 5 mg x 30 comp masticable

PRINCIPIO ACTIVO

Montelukast.

MODO DE USO:

Adultos 1 - 2 comprimidos como dosis única, puede repetirse a intervalos de 6 - 8 horas. No debe excederse una dosis máxima diaria de 6 comprimidos.

PRECAUCIONES

Consulte a su médico antes de tomar este en niños menores de 6 años. Adultos y niños mayores de 15 años: 1 comprimido recubierto de 10 mg al día al acostarse. Asventol puede tomarse con o sin alimentos. A los pacientes debe recomendarse que continúen con el tratamiento mientras su asma esté controla-

da, así como durante los períodos de agravamiento del asma. No se requiere ajuste de dosis en pacientes geriátricos, insuficientes renales o hepáticos leve o moderado. Puede agregarse al régimen existente de tratamiento del asma. Cuando una respuesta clínica es evidente, puede reducirse la terapia broncodilatadora o corticoesteroidal, según sea tolerado. Asventol no debe sustituirse bruscamente por corticoesteroides inhalados.

ADVERTENCIAS Y/O PRECAUCIONES

Montelukast en general ha sido bien tolerado. Las siguientes reacciones adversas han sido reportadas en adultos con una incidencia mayor o igual a un 1 % y mayor que con placebo: astenia, fatiga, fiebre, dolor abdominal, dispepsia, gastroenteritis, mareos, cefalea, tos, rash. En pacientes pediátricos de 6 a 14 años,

el perfil de seguridad fue similar al perfil observado en los adultos a excepción de los siguientes efectos adversos, que ocurrieron con una frecuencia mayor o igual al 2% y mayor que con placebo: diarrea, laringitis, faringitis, náusea, otitis, sinusitis e infección viral.

DISTRIBUCIÓN

Bajo Receta en Farmacias