

Atenolol*Antihipertensivo, antianginoso*

- 25 mg. x 30 comp.
- 50 mg. x 30 comp
- 100 mg. x 30 comp.

FORMULA:

Cada comprimido contiene:
Atenolol25, 50 y 100 mg
Excipientes
c.s.

ACCION TERAPEUTICA:

El Atenolol es un bloqueante selectivo de los receptores beta adrenérgicos del miocardio.

INDICACIONES Y POSOLOGIA:

Angor Pectoris: 100 mg / día en dosis única o dividida.

Con esta dosificación se obtiene el máximo beneficio terapéutico y no es probable que hayan beneficios adicionales con el incremento de la dosis.

Hipertensión arterial:
Generalmente se necesita una dosis diaria de 100 mg en una sola toma. La respuesta terapéutica quedará totalmente equilibrada en el término de 10 - 15 días.

Las experiencias recientes han demostrado que el Atenolol en dosis menores a las habituales como medicación cardio-selectiva es de gran utilidad en variados estados de desequilibrios neurovegetativos, ansiedad, temblores, estados depresivos,

sin las habituales contraindicaciones de los diversos grupos de psicofármacos corrientemente usados en el tratamiento de dichos trastornos.

CONTRAINDICACIONES:

Bloqueo AV de segundo o tercer grado. Insuficiencia cardíaca congestiva, salvo que el paciente esté tratado con cardiotónicos y esté compensado.

INTERACCIONES:

ATENOCAR puede ser utilizado en combinación con otros fármacos hipotensores, particularmente con diuréticos, con lo que se consigue una terapia antihipertensiva de gran efectividad y conveniencia.

No se utilizará concomitantemente con Verapamil y / o Clonidina.

REACCIONES ADVERSAS / EFECTOS COLATERALES:

Las más comunes son frialdad en las extremidades, fatiga muscular y en casos aislados bradicardia.

ADVERTENCIA:

Es posible usar ATENOCAR en pacientes con enfermedad obstructiva crónica de vías respiratorias, en contraste con los beta bloqueadores NO cardioselectivos. Si hubiera aumento de resistencia de las vías respiratorias en su porción inferior se corrige fácilmente con BRONTEL ó similares broncodilatadores.

Suspender la medicación 48 horas antes de someter al paciente a anestesia general con éter, ciclopropano ó tricloroetileno. Si hubiera necesidad del uso de anestésicos gaseosos y se produjeran efectos vagales intensos, se puede corregir con Atropina (1,2 mg - i.v.)

En neuro-psiquiatría, iniciar el tratamiento con 25 ó 50 mg diarios, siempre en dosis única.

PRESENTACION:

ATENOCAR 25: Caja x 30 comprimidos.

ATENOCAR 50: Caja x 30 comprimidos.

ATENOCAR 100: Caja x 30 comprimidos.

