



duzcan aumento en eliminación de Potasio, pudiera incrementar la hipocalemia; con glucósidos cardíacos pueden aumentar la posibilidad de arritmias o toxicidad por digital asociada con hipokalemia y su uso puede fomentar la depleción de Potasio causada por anfotericina B. Se deberán realizar determinaciones de electrolitos en suero, especialmente los niveles de Potasio. El uso de esteroides con anticoagulantes cumarínicos puede aumentar o reducir el efecto anticoagulante, posiblemente, necesitando un ajuste de la posología.

El uso combinado con AINEs y/o alcohol con corticosteroides pueden aumentar la incidencia o incrementar la gravedad de úlceras gastrointestinales. En pacientes diabéticos puede requerirse un ajuste del fármaco antidiabético.

#### **SOBREDOSIFICACIÓN:**

Los casos de intoxicaciones son muy raros, excepto a las posologías más extremas, es improbable que unos pocos días de administración excesiva de esteroides causen resultados lesivos si no existen contraindicaciones específicas, como el caso de pacientes con diabetes mellitus, glaucoma o úlcera péptica activa, o en pacientes tratados con digital, cumarínicos o diuréticos. Tratamiento: indicación de emesis o lavado gástrico, además del tratamiento apropiado en las complicaciones resultantes de los efectos metabólicos de los esteroides.

#### **RESTRICCIONES DE USO:**

En caso de embarazo, debe ponderarse el riesgo de la corticoterapia o de la supresión de la misma; asimismo, debe consultarse al médico en caso de aparición de síntomas de enfermedades agudas: infecciosas, digestivas o alteraciones psíquicas.

#### **CONSERVACIÓN:**

En su envase original, a temperatura ambiente (15° a 30°C).

#### **PRESENTACIONES:**

Envase conteniendo 15 mL. de Solución Gotas Orales.

Envase conteniendo 20-40 comprimidos.

