

BLOX ^{SAVAL}

Candesartan cilexetil, hidrocloreto

Antihipertensivo

- 8 mg. Caja x 30 comp.
- 16 mg. Caja x 30 comp.
- 32 mg. Caja x 30 comp.

COMPOSICIÓN

Cada comprimido ranurado contiene:

Candesartan cilexetil 8 y 16 mg.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

Candesartan es bloqueador del receptor AT1 de angiotensina II, con una fuerte unión y lenta disociación de éste. Reduce la presión arterial de manera prolongada y dosis dependiente. Es inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, disminuye la resistencia periférica, en tanto que, la frecuencia cardíaca, volumen sistólico y volumen minuto, no son afectados.

INDICACIONES

BLOX está indicado en el tratamiento de, Hipertensión arterial, Insuficiencia Cardíaca.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Las dosis estudiadas van desde 4 a 32 mg una vez al día. Como toda terapia antihipertensiva el efecto máximo se obtiene dentro de cuatro semanas, después de iniciado el tratamiento. Se puede combinar BLOX con diurético tiazídico en caso necesario. BLOX debe ser ingerido una vez por día, con o sin alimentos. En adultos mayores no es necesario ajustar la dosis.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del producto. También está contraindicado en embarazo y lactancia.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Estenosis de la arteria renal. En pacientes con depleción del volumen intravascular severa (como es el caso de aquellos que reciben altas dosis de diuréticos) puede ocurrir hipotensión sintomática, como se describe también para otros agentes que inhiben el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, esta condición debe ser corregida antes de administrar BLOX, o considerar una dosis inicial más baja (4 mg). Diuréticos ahorradores de Potasio: la administración concomitante de BLOX con diuréticos ahorradores de Potasio puede teóricamente incrementar los niveles de Potasio sérico.

REACCIONES ADVERSAS

BLOX es bien tolerado y tiene un perfil de efectos adversos comparable a placebo. Los efectos adversos son, en general, leves y transitorios. En los estudios, el abandono del tratamiento debido a efectos adversos fue similar a placebo, Candesartan (2,4%) y con placebo (2,6%). Los efectos adversos informados con una incidencia mayor al 2% fueron, cefalea, infección del tracto respiratorio alto, dolor de espalda y mareos. Se informó como efecto adverso un aumento en S-ALAT sérica (S-GPT) con mayor frecuencia con BLOX que con placebo (1,3% versus 0,5%).

INTERACCIONES

No se han identificado interacciones clínicas significativas. Los compuestos investigados en estudios de farmacocinética clínica asociados al tratamiento con Candesartan, incluyen hidroclorotiazida, warfarina, digoxina, anticonceptivos orales (por ejemplo etinilestradiol/ levonorgestrel), glibenclamida y nifedipino.

SOBREDOSIFICACIONES

La principal manifestación de una sobredosis es probablemente la hipotensión. Si ocurre hipotensión severa, debe ser instituido tratamiento y monitoreo de los signos vitales. Se puede incrementar el volumen plasmático por infusión, de solución salina isotónica. Si las medidas mencionadas no son suficientes, pueden ser administradas drogas simpaticomiméticas. No es probable eliminar Candesartan por hemodiálisis.

ALMACENAJE

Almacenar por debajo de 25°C. Protegido de la luz y la humedad.

PRESENTACIÓN

Cada comprimido ranurado de BLOX contiene Candesartan cilexetil 8, 16 y 32mg. Envase con 30 comprimidos.

BLOX D ^{SAVAL}

Candesartán cilexetil, hidroclorotiazida

Antihipertensivo diurético

- 8/12,5 mg. Caja x 30 comp.
- 16/12,5 mg. Caja x 30 comp.
- 32/12,5 mg. Caja x 30 comp.

COMPOSICIÓN

Cada comprimido ranurado contiene:

Candesartan 8 mg / Hidroclorotiazida 12,5 mg. Candesartan 16 mg / Hidroclorotiazida 12,5 mg

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

BLOX-D es una asociación antihipertensiva de última generación, fundamentada en la duradera y selectiva unión de Candesartan al receptor AT1 de angiotensina II, más la eficaz acción natriurética de hidroclorotiazida, es un fármaco de gran eficacia antihipertensiva con un perfil de seguridad y protección que perdura incluso más allá de 24 horas.

INDICACIONES

BLOX-D está indicado en hipertensión arterial moderada y severa. Insuficiencia Cardíaca. Refractoriedad a monoterapia o refractoriedad a otros antihipertensivos.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Administrar 1 comprimido 1 vez al día.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del producto. También está contraindicado en embarazo y lactancia. Pacientes con anuria o hipersensibilidad a las sulfas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Se debe tener precaución en estenosis de arterial renal, en pacientes con depleción de volumen intravascular, en daño renal, daño hepático, estenosis aórtica y válvula mitral hemodinámicamente relevante o cardiomiopatía hipertrófica obstructiva. No es necesario el ajuste de dosis en el paciente adulto mayor.

REACCIONES ADVERSAS

BLOX-D es bien tolerado y con un perfil de seguridad comparable a placebo. Los efectos adversos son, en general leves y transitorios. Se ha reportado dolor abdominal, palpitaciones, dolor de espalda, mareos, tos, sinusitis, rash, náuseas y vómito.

INTERACCIONES

No se han identificado interacciones clínicas significativas. Precauciones al administrar junto a alcohol, barbitúricos o narcóticos, junto a drogas antidiabéticas u otras drogas antihipertensivas. Litio.

SOBREDOSIFICACIONES

La principal manifestación de una sobredosis es probablemente la hipotensión. Si ocurre hipotensión, debe ser instituido tratamiento y monitoreo de signos vitales. Se puede incrementar el volumen plasmático por in-

fusión de solución salina isotónica. Si las medidas mencionadas no son suficientes, pueden ser administradas drogas simpaticomiméticas. No es probable eliminar Candesartan por hemodiálisis.

ALMACENAJE

Almacenar por debajo de de 30°C. Protegido de la luz y la humedad.

PRESENTACIÓN

Envases por 30 comprimidos ranurados de BLOX-D 8 /12,5 y BLOX-D 16 /12,5

