

DERMOSONA SAVAL

Mometasona furoato anhidra

- Crema dermica pomó x 15 gr.

COMPOSICIÓN

Cada gramo de crema contiene: Furoato de mometasona 1 mg (0,1%).

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

Furoato de mometasona es un corticosteroide sintético, que presenta excelentes propiedades antiinflamatorias, antipruriginosas, y vasoconstrictoras, además de un bajo potencial de efectos adversos, tanto locales como sistémicos.

INDICACIONES

Alivio de las manifestaciones inflamatorias y pruríticas de las dermatosis corticosenibles, como es el caso de la dermatitis atópica, dermatitis alérgica de contacto y psoriasis.

POSOLÓGIA Y ADMINISTRACIÓN

Aplicar una vez al día mediante una fina capa de crema esparcida sobre las áreas cutáneas afectadas. No usar vendaje oclusivo.

CONTRAINDICACIONES

DERMOSONA está contraindicado en pacientes sensibles al furoato de mometasona, a otros corticosteroides o a cualquier componente de esta preparación.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Si se produjera irritación o sensibilización con el uso de DERMOSONA, debe suspenderse su administración aplicándose además las medidas pertinentes. Las regiones faciales, axilar e inguinal, son más susceptibles de presentar reacciones adversas locales. En presencia de infección, debe agregarse tratamiento con un antimicótico o antibacteriano apropiado según el caso. Si pese a ello, no se observa una rápida respuesta favorable, DERMOSONA debe suspenderse hasta que la infección haya cedido. Como no se ha establecido la seguridad de su uso en embarazo y lactancia, DERMOSONA, al igual que otros corticosteroides tópicos, debe usarse sólo si el beneficio esperado justifica correr un riesgo potencial. DERMOSONA, no está indicada para uso oftálmico. No usar por periodos prolongados especialmente en ancianos

y lactantes.

REACCIONES ADVERSAS

Son escasos los reportes de reacciones adversas locales comunicadas con furoato de mometasona crema, e incluyen ardor, irritación, sequedad, prurito y signos de atrofia cutánea.

INTERACCIONES

No se han descrito.

SOBREDOSIFICACIONES

El uso excesivo y prolongado de los corticosteroides tópicos puede deprimir la función hipofis-suprarrenal, causando insuficiencia suprarrenal secundaria. En tal caso debe indicarse un tratamiento apropiado. Se debe tratar el desequilibrio electrolítico, si es necesario. En casos de toxicidad crónica se aconseja suspender lentamente el uso de los corticosteroides.

Almacenaje

Almacenar por debajo de 30°C. No congelar.

PRESENTACIÓN

Pomó de 15 g de crema.