

DIFENAC FAPASA**Diclofenac Sódico***Antiinflamatorio-analgésico*

- Sol. iny. 6 amp. x 3 mL.

COMPOSICIÓN:

Cada ampolla contiene: diclofenac potásico 75mg, excipientes cs.

INDICACIONES:

Artritis reumatoidea: artritis psoriásica, poliartritis reumatoidea, espondilartrosis, artritis gotosa. Reumatismo extraarticular: periartritis humeroescapular, bursitis, tendinitis, etc. Artrosis degenerativa: coxartrosis, gonartrosis, espondilartrosis, paliartrosis, etc. Procesos inflamatorios y dolorosos postraumáticos y posoperatorios: fracturas, contusiones, esguinces, luxaciones, mialgias, ruptura muscular, posoperatorio de cirugía ortopédica, ginecología, estomatología, etc.

DOSIFICACIÓN:SS

DIFENAC NF Inyectable se indica: 1 ampolla por día vía IM profunda pudiendo aumentarse a 2 ampollas/día. Cirugía torácica: 75mg = 1 ampolla cada 12 horas, durante 3 días. Artroplástica: 75mg = 1 ampolla cada 8 horas, o 75mg = 1 ampolla cada 12 horas o IV 75mg = 1 ampolla en 1 hora, seguir con 5mg 1 hora durante 15 horas. Cirugía abdominal: 75mg = 1 ampolla cada 12 horas. Ligadura de trompa: IV 250mg/kg (3 dosis según necesidad).

PRESENTACIÓN:

Env. con 6 amp.

DIFENAC B1,B6,B12 FAPASA**Tiamina, Diclofenac,****Piridoxina Vitamina B12***Antineurítico antiinflamatorio*

- Envase Caja x 20 comp. recub.

COMPOSICIÓN:

Cada comprimido contiene: Diclofenac Sódico 50mg, Mononitrato de Tiamina 50mg, Clorhidrato de Piridoxina 100mg, Cianocobalamina 5mg, excipientes cs.

INDICACIONES:

Está indicado en procesos dolorosos agudos y crónicos como reumatismos artrósicos o artríticos, espondilitis anquilosante, patologías discovertebrales: lumbalgia, ciatalgia, neuralgia cervicobraquial. Se indica con éxito en reumatismos extraarticulares, miositis, periartritis y en dolores postraumáticos, posquirúrgicos, odontológicos, inflamaciones otológicas, jaquecas y migrañas, dismenorreas.

DOSIFICACIÓN:

En adultos la dosis media es de dos a tres comprimidos diarios con las comidas. En pacientes ancianos es conveniente no superar los 100mg diarios de Diclofenac.

PRESENTACIÓN:

Env. con 20 comp.

DIFENAC COMPLEX NF FAPASA**Dexametasona, Diclofenac, Cianocobalamina.***Antineurítico antiinflamatorio*

- 50 mg. x 20 comp. rec.

DIFENAC N.F FAPASA**Diclofenac Potásico***Antiinflamatorio-analgésico*

- 50 mg. x 20 comp. rec.

COMPOSICIÓN:

Cada comprimido recubierto contiene: diclofenac potásico 50mg, excipientes cs.

INDICACIONES:

Artritis reumatoidea: artritis psoriásica, poliartritis reumatoidea, espondilartrosis, artritis gotosa, reumatismo extraarticular: periartritis humeroescapular, bursitis, tendinitis, tenosinovitis, etc. Artrosis degenerativa: coxartrosis, gonartrosis, espondilartrosis, paliartrosis, etc. Procesos inflamatorios y dolorosos postraumáticos y posoperatorios: fracturas, contusiones, esguinces, luxaciones, mialgias, ruptura muscular, posoperatorio de cirugía ortopédica, ginecología, estomatología, etc.

DOSIFICACIÓN:

Dosis de ataque: 1 comprimido 3 veces al día. Dosis de mantenimiento: 1 comprimido 2 veces al día.

PRESENTACIÓN:

Envases con 20 comprimidos.

DIFENAC RELAX FAPASA**Diclofenac Potásico****Carisoprodol***Miorrelajante antiinflamatorio*

- Caja x 20 comp. rec.

COMPOSICIÓN:

Cada comprimido contiene: Diclofenac 50mg, Carisoprodol 350mg, excipientes cs.

INDICACIONES:

Dolores musculares reumáticos, posoperatorios, por espasmo muscular, tensiones psicósomáticas, tortícolis, lumbago, torceduras, esguinces, bursitis, reumatismo muscular.

DOSIFICACIÓN:

1 comprimido 2 a 3 veces por día, según criterio del médico tratante.

PRESENTACIÓN:

Env. con 20 comp.

DIFENAC 75 SR. NF. FAPASA**Diclofenac potásico***Analgésico antiinflamatorio*

- 75 mg. x 20 comp. rec. lp.

COMPOSICIÓN

Cada comprimido recubierto de acción prolongada contiene: Diclofenac Potásico 75 mg, excipientes cs.

INDICACIONES

Reumatismos degenerativos e inflamatorios: artrosis, poliartritis reumatoidea, espondilartrosis anquilosante. Patología discovertebral: lumbalgia, ciática, neuralgia cervicobraquial. Reumatismo extraarticular: periartritis escapulo-humeral. Estados inflamatorios y edematosos postraumáticos, especialmente del área ORL y estomatológica. Cólico biliar y renal.

DOSIFICACIÓN

Adultos: según indicación médica. Dosis de ataque: 150mg/día, 2 comprimidos (1 cada 12 horas). Dosis de mantenimiento: 75mg/día, 1 comprimido diario. Los comprimidos de acción prolongada no deben partirse ni masticarse. Deben ingerirse con abundante líquido y preferentemente con las comidas.

PRESENTACIÓN

Env. con 20 comp. recub. de acción prolongada.