

## DIUSARTAN QUIMFA

### Sacubitrilo, Valsartan

Tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica

- 50mg Caja x 60 comp.
- 100mg Caja x 60 comp.

### DIUSARTAN 50

#### FÓRMULA:

Cada comprimido recubierto contiene:

Sacubitrilo ..... 24,3 mg.

Valsartán.....25,7

mg. Como complejo salino sódico Sacubitrilo y Valsartán (Equiv. a 56,5 mg de Sacubitrilo Valsartán sódico 2,5 H<sub>2</sub>O)

Excipientes.....c. s.p.

### DIUSARTAN 100

#### FÓRMULA:

Cada comprimido recubierto contiene:

Sacubitrilo ..... 48,6 mg.

Valsartán..... 51,4 mg.

Como complejo salino sódico Sacubitrilo y Valsartán (Equiv. a 113 mg de Sacubitrilo Valsartán sódico 2,5 H<sub>2</sub>O)

Excipientes.....c. s.p.

### INDICACIONES

#### TERAPÉUTICAS:

DIUSARTAN está indicado en pacientes adultos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica sintomática con fracción de eyección reducida.

### REACCIONES ADVERSAS Y EFECTOS COLATERALES:

Las reacciones adversas que pueden ser notificadas con mayor frecuencia durante el tratamiento con Diusartan son hipotensión, hiperpotasemia e insuficiencia renal (ver Precauciones); así como también angioedema.

Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema de Farmacovigilancia: farmacovigilancia@quimfa.com.py

