

DOLGENAL FAPASA**Ketorolac trometamina**

Analgésico. Antiinflamatorio

- 10 mg. x 30 comp. rec.
- 20 mg. comp. rec. caja x 10
- 20 mg. comp. rec. caja x 30
- 30 mg. x 1 amp.X 1 mL.
- 60 mg. x 1 amp.lny. (IV-IM)

COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:

Ketorolac trometamina 10mg y 20mg, excipientes cs.

Cada ampolla contiene:

Ketorolac trometamina 30mg y 60mg, excipientes cs.

INDICACIONES

Vía oral: tratamiento a corto plazo del dolor agudo moderado a severo.

Vía parenteral: tratamiento a corto plazo del dolor posoperatorio agudo moderado a severo.

DOSIFICACIÓN

Comprimidos: dosis inicial: 10mg; dosis de mantenimiento: 10-20mg cada 6 horas por 5 días como máximo. Ampollas IM-IV-goteo: dosis inicial: 10mg; dosis de mantenimiento: 10-30mg cada 8 horas por 2 días como máximo. Goteo: 60mg en 500mL de solución fisiológica al 5% (0,12mg/mL). Dosis diaria máxima tanto por vía oral o parenteral: 90mg/día.

PRESENTACIÓN

Env. con 30 comp. de 10mg.

Env. con 10 y 30 comp. de 20mg.

Env. con 1 amp. de 60mg.

DOLGENAL SL FAPASA**Ketorolac trometamina**

Analgésico antiinflamatorio

- Caja x 10 Comp. subl.

COMPOSICIÓN:

Cada comprimido sublingual contiene: Ketorolac Trometamina 10mg, excipientes cs.

INDICACIONES:

Analgésico apropiado para tratamientos de menos de 5 días de duración.

DOSIFICACIÓN:

Los comprimidos no deben masticarse ni tragarse. Deben colocarse debajo de la lengua durante un lapso no menor de 5 minutos. La dosis diaria se adecuará a la intensidad del dolor aceptándose como dosis máxima 90mg/día. Dosis inicial: 10mg. Dosis de mantenimiento: 10mg a 20mg cada 6 horas, no debiendo exceder la duración del tratamiento, los 5 días.

PRESENTACIÓN:

Env. con 10 comp. subl.