

DUALTEN SAVAL

Carvedilol

Antiaginoso antihipertensivo

- 12,5 mg. x 30 comp.
- 25 mg. x 30 comp.
- 6,25 mg. x 30 comp.

COMPOSICIÓN

Cada comprimido ranurado contiene:

Carvedilol 6,25 mg, 12,5 mg ó 25 mg.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

Carvedilol es betabloqueador adrenérgico no selectivo, con propiedades vasodilatadoras y antioxidantes. La vasodilatación se consigue principalmente por bloqueo selectivo de adrenorreceptores alfa 1. Reduce la resistencia vascular periférica mediante vasodilatación.

El equilibrio entre vasodilatación y betabloqueo en hipertensos con taquicardia, disminuye la presión arterial sin incrementar la resistencia periférica, como se observa con los otros betabloqueadores.

INDICACIONES

Hipertensión arterial con taquicardia, puede utilizarse solo o combinado con otros antihipertensivos, especialmente con diuréticos del tipo de las tiazidas. Cardiopatía isquémica. Insuficiencia cardiaca clase II-IV de la NYHA.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Según prescripción médica. Las dosis varían desde 6,25 hasta 25 mg en la mayoría de los casos. Se debe iniciar la terapia con la menor dosis posible. Las dosis se deben incrementar a intervalos de dos semanas. En insuficiencia cardiaca congestiva se recomienda estabilizar primero las dosis de digitálicos, diuréticos y de IECA cuando sea el caso, iniciando la terapia con 6,25 mg. Si es necesario, se debe incrementar la dosis cada 2 semanas, hasta llegar a la dosis óptima.

CONTRAINDICACIONES

En asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bloqueo atrioventricular de segundo o tercer grado, bradicardia severa, síndrome sinusal sin marcapaso, insuficiencia cardiaca descompensada que requiera terapia intravenosa inotrópica, insuficiencia hepática, hipersensibilidad al fármaco.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Usar con precaución en casos de insuficiencia cardiaca congestiva acompañada de hipotensión (presión sistólica < 100 mmHg), enfermedad cardiaca isquémica, insuficiencia renal, enfermedad vascular difusa (diabetes, hipoglicemia, hipertiroidismo), bronquitis crónica, enfisema. En caso de ser necesario interrumpir la terapia, se debe discontinuar en forma gradual. En pacientes que padecen de trastornos circulatorios periféricos, el uso de carvedilol puede exacerbar estos síntomas. Carvedilol puede enmascarar los síntomas de una tirotoxicosis. Proceder con precaución en pacientes que van a ser sometidos a cirugía general, debido a la sinergia de los efectos inotrópicos negativos e hipotensores con los anestésicos. En pacientes con psoriasis se debe evaluar el riesgo-beneficio antes de administrar DUALTEN. En pacientes en que se administre DUALTEN en conjunto con antagonistas de calcio, se debe controlar ECG y presión arterial. No es recomendable su uso en el embarazo y lactancia.

REACCIONES ADVERSAS

Las reacciones adversas más comunes que se presentan en más del 1% de los pacientes son cefaleas, mareos, fatiga, ánimo deprimido, trastornos del sueño, hipotensión postural, hipercolesteroemia.

INTERACCIONES

Puede potenciar el efecto de antagonistas de los receptores alfa1. No administrar conjuntamente con diltiazem. Al administrar con digoxina se recomienda ajuste de la dosis y monitorización de los niveles de esta. Cuando se va a suspender un tratamiento combinado con carvedilol y clonidina, el primero en ser retirado debe ser DUALTEN con varios días de antelación, antes de proceder a una disminución paulatina de la dosis de clonidina. Rifampicina puede disminuir los niveles séricos de carvedilol, en cambio cimetidina puede elevar sus niveles séricos.

SOBREDOSIFICACIONES

La sobredosis puede producir, hipotensión grave, bradicardia, insuficiencia cardiaca, shock cardiogénico y paro cardiaco.

Por otra parte, se pueden presentar problemas respiratorios, broncoespasmos, vómitos, alteraciones de conciencia y convulsiones generalizadas. Para el tratamiento, además de los procedimientos generalizados, es necesario monitorear y corregir los parámetros vitales, en condiciones de cuidados intensivos, si fuese necesario.

ALMACENAJE

Almacenar por debajo de los 30°C, protegido de la luz y la humedad.

PRESENTACIÓN

Estuches con 30 comprimidos ranurados de 6,25 mg, 12,5 mg ó de 25 mg.