

ETIMICIN ETICOS

Azitromicina

Antibiótico

- 500 mg. x 6 comp. recub.
- 200mg. Caja x 1 fco. c/ polv. p/ susp. + 1 fco. c/ soluc. diluy. x 30 mL + got. dosif.

COMPOSICIÓN.

Cada 5mL de suspensión oral reconstituida contiene:

Azitromicina 200mg en un excipiente de lactosa, celulosa, esencia de frutas, sacarosa y fosfato sódico.

CADA COMPRIMIDO RECUBIERTO CONTIENE:

Azitromicina 500mg en un excipiente de povidona, aerosil y estearato de magnesio.

INDICACIONES.

Está indicado para el tratamiento de infecciones causadas por cepas susceptibles de los microorganismos enumerados en las condiciones específicas indicadas a continuación. Tracto respiratorio inferior: bronquitis. Exacerbaciones bacterianas agudas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica debidas a *Haemophilus influenzae*, *Moraxella catarrhalis* o *Streptococcus pneumoniae*. Neumonía adquirida en la comunidad causada por *Streptococcus pneumoniae* o *Haemophilus influenzae* en pacientes adecuados para el tratamiento oral ambulatorio. Neumonía causada por *Mycoplasma pneumoniae*. Tracto respiratorio superior: faringitis o amigdalitis por *Streptococcus pyogenes*. ETIMICIN en nasofaringitis es efectivo en la erradicación de las cepas susceptibles de *Streptococcus pyogenes*.

Piel y estructura de la piel: infecciones no complicadas de la piel y de la estructura de la piel causadas por *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pyogenes* o *Streptococcus agalactiae*. Los abscesos generalmente requieren un drenaje quirúrgico asociado con el tratamiento. Enfermedades transmitidas sexualmente: uretritis no gonocócica y cervicitis causadas por *Chlamydia trachomatis*.

DOSIFICACIÓN.

Se administra una sola vez por día y al igual que muchos otros antibióticos, debe tomarse por lo menos 1 a 2 horas antes o 2 horas después de comer. Adultos: en el caso de enfermedades de transmisión sexual causadas por *Chlamydia trachomatis*, la dosis es una monodosis de 4 cápsulas tomadas juntas. Para toda otra prescripción, incluyendo ancianos, la dosis total es de 1,5g administrada en 2 cápsulas diarias durante 3-6 días. Niños: se recomienda una dosis diaria de 10mg/kg de peso durante 3-6 días (dosis total 30mg/kg). Pacientes geriátricos: los parámetros farmacocinéticos en voluntarios mayores (65-85 años) fueron similares a aquellos en voluntarios más jóvenes (18-40 años) para el régimen terapéutico de 5 días. No parece ser necesario un ajuste de la dosis para pacientes mayores con funcionamiento renal y hepático normal, que reciben tratamiento con este régimen de dosificación.

Debe advertirse a los pacientes que tomen esta medicación por lo menos una hora antes de la comida o por lo menos dos horas después. Esta medicación no debe ingerirse con la comida. También debe advertirse a los pacientes que no tomen simultáneamente antiácidos que contengan aluminio o magnesio y ETIMICIN. Instrucciones para preparar la suspensión: agregar la solución diluyente, tapar el frasco y agitar energicamente, luego de utilizar guardar la suspensión en un lugar fresco, fuera del alcance de los niños. Precaución: no sustituir la solución diluyente por agua u otro tipo de solvente.

CONTRAINDICACIONES.

Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad confirmada a la azitromicina, eritromicina u otro antibiótico macrólido.

ADVERTENCIAS.

Se ha registrado colitis pseudomembranosa con casi todos los agentes antibacterianos y puede tener una severidad de leve a realmente peligrosa para la vida del paciente. Por lo tanto, es importante tener en cuenta este diagnóstico en pacientes que presentan diarrea luego de la administración de agentes antibacterianos. El tratamiento con agentes antibacterianos altera la flora normal del colon y puede permitir el crecimiento excesivo de *Clostridium*. Los estudios indican que una toxina producida por el *Clostridium difficile* es la causa fundamental de la colitis asociada con el antibiótico.

SOBREDOSIFICACIÓN.

No hay datos referentes a sobredosis con ETIMICIN (azitromicina). Los síntomas típicos de sobredosis con antibióticos macrólidos incluyen pérdida de la audición, náuseas severas, vómitos y diarrea. Se indica lavaje de estómago y las medidas generales utilizadas en estos casos.

PRESENTACIÓN.

Fco. con polvo para preparar 30mL de susp. Env. con 6 comp. rec. 500mg.