

## EUROGESIC ADULTO SAVAL

### Naproxeno

*Antipirético analgésico antiinflamatorio*

- 275mg Adulto x 10 comp. recub.
- 10% Gel. x 30 gr.

### COMPOSICIÓN

Cada comprimido adulto contiene:

Naproxeno sódico 275 mg.

### PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

Naproxeno sódico es un agente analgésico Antiinflamatorio no esterooidal, no narcótico, con marcadas propiedades antipiréticas.

Naproxeno no es depresor del SNC y no induce metabolismo enzimático. Es rápida y completamente absorbido desde el intestino luego de su administración oral.

### INDICACIONES

Como analgésico y antiinflamatorio en procesos inflamatorios y dolorosos, crónicos y agudos de tejidos blandos y músculo esquelético.

Como analgésico y antiinflamatorio en bursitis, tendinitis, sinovitis, tenosinovitis y lumbago. Para acción analgésica después de torceduras, esguinces, manipulaciones ortopédicas, extracciones dentales y cirugía. Para relajación uterina y analgésico en el post parto para la madre que no amamanta. Como analgésico en dismenorrea y luego de inserción de DIU.

Como analgésico antiinflamatorio en artritis reumatoidea, osteoartritis (artritis degenerativa), espondilitis anquilosante y gota.

### POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Adultos:

2 comprimidos de 275 mg como dosis inicial y luego 1 comprimido cada 6 a 8 horas.

En artritis reumatoide juvenil : 10 mg/kg/día dividida cada 12 horas.

### CONTRAINDICACIONES

Embarazadas, lactantes y en los casos de hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico u otros AINE (posibilidad de hipersensibilidad cruzada).

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Como EUROGESIC tiene alta afinidad por proteínas, puede desplazar a otros fármacos; por lo tanto, se debe tener precaución en terapias con anticoagulantes, hidantoínas, warfarina, hipoglicemiantes orales, etcétera. Administrar bajo supervisión médica a pacientes con insuficiencia cardíaca, hepática o renal. En pacientes con enfermedad gastrointestinal.

### REACCIONES ADVERSAS

Puede interferir en la agregación plaquetaria, dolor epigástrico, náuseas, malestar abdominal, cefalea, vértigo.

### INTERACCIONES

Por su gran capacidad de unirse a proteínas, debe ser monitoreado el uso concomitante con hidantoínas.

Administrar con precaución en conjunto con betabloqueadores como el propranolol, probenecid y metotrexate. Se recomienda precaución con anticoagulantes o sulfonilureas.

### SOBREDOSIFICACIONES

Una dosis significativa puede provocar mareos, indigestión, náuseas y vómitos.

### ALMACENAJE

Almacenar por debajo de los 30°C . Protegido de la luz y la humedad (comprimidos).

### PRESENTACIÓN

Envase con 10 comprimidos adulto.

## EUROGESIC FORTE SAVAL

### Naproxeno

*Antipirético analgésico antiinflamatorio*

- 10 comp. recub.

### COMPOSICIÓN

Cada comprimido FORTE contiene:

Naproxeno sódico 550 mg

### PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

Naproxeno sódico es un agente analgésico antiinflamatorio no esterooidal, no narcótico, con marcadas propiedades antipiréticas. Naproxeno no es depresor del SNC y no induce metabolismo enzimático. Es rápida y completamente absorbido desde el intestino luego de su administración oral.

### INDICACIONES

Como analgésico y antiinflamatorio en procesos inflamatorios y dolorosos, crónicos y agudos de tejidos blandos y músculo esquelético. Como analgésico y antiinflamatorio en bursitis, tendinitis, sinovitis, tenosinovitis y lumbago. Como acción analgésica después de torceduras, esguinces, manipulaciones ortopédicas, extracciones dentales y cirugía. Para relajación uterina y analgésico en el post parto para la madre que no amamanta. Como analgésico en dismenorrea y luego de inserción de DIU. Como analgésico antiinflamatorio en artritis reumatoidea, osteoartritis (artritis degenerativa), espondilitis anquilosante y

gota.

### POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

La dosis usual es de 1 a 2 comprimidos cada 12 horas, llegando a un máximo de 3 comprimidos al día por no más de 2 semanas.

### CONTRAINDICACIONES

Embarazadas, lactantes y en los casos de hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico u otros AINE (posibilidad de hipersensibilidad cruzada).

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Como EUROGESIC tiene alta afinidad por proteínas, puede desplazar a otros fármacos; por lo tanto, se debe tener precaución en terapias con anticoagulantes, hidantoínas, warfarina, hipoglicemiantes orales, etc. Administrar bajo supervisión médica a pacientes con insuficiencia cardíaca, hepática o renal. En pacientes con enfermedad gastrointestinal.

### REACCIONES ADVERSAS

Puede interferir en la agregación plaquetaria, puede producir dolor epigástrico, náuseas, malestar abdominal, cefalea, vértigo.

### INTERACCIONES

Por su gran capacidad de unirse a proteínas, debe ser monitoreado el uso concomitante con hidantoínas. Administrar con precaución en conjunto con betabloqueadores como propranolol; precaución junto a probenecid, metotrexato. Se recomienda precaución con anticoagulantes o sulfonilureas.

### SOBREDOSIFICACIONES

Una dosis significativa puede provocar mareos, indigestión, náuseas y vómitos.

### ALMACENAJE

Almacenar a no más de 30°C, protegido de la luz y la humedad.

### PRESENTACIÓN

Envase con 10 comprimidos.