

HEXODERM ^{ETICOS}

Betametasona

Antiinflamatorio tópico

- 0,1% Crema x 20 gr.

HEXODERM FORTE ^{ETICOS}

Propionato de clobetasol

Antiinflamatorio local

- 0,05% Crema x 20 gr.

COMPOSICIÓN.

Cada gramo de crema contiene: clobetasol propionato 0,5mg, excipientes cs.

PROPIEDADES.

El propionato de clobetasol pertenece al grupo de los glucocorticoides modificados, que poseen dos halógenos: flúor y cloro que aumentan netamente la acción antiinflamatoria, siendo un preparado para uso local externo. Es altamente efectivo como antialérgico, antiinflamatorio, antipruriginoso y vasoconstrictor, permitiendo un rápido alivio de la inflamación y el prurito gracias a la suma de sus efectos.

INDICACIONES.

Es un corticoide tópico muy activo, de gran valor para períodos cortos de tratamiento de dermatosis de baja respuesta, tales como psoriasis, eccemas rebeldes, liquen plano, lupus eritematoso discoide, y otras afecciones que no responden satisfactoriamente a esteroides de menor potencia.

MODO DE USO.

HEXODERM FORTE se debe aplicar sobre el área afectada 1 a 2 veces por día hasta lograr mejoría. Al igual que otros esteroides tópicos potentes, la terapéutica debe ser discontinuada al lograrse el control, que por lo general se logra en pocos días. En caso necesario, puede continuar el tratamiento, pero sin pasar de 4 semanas. Pueden usarse cursos repetidos de tratamiento para controlar las exacerbaciones. En caso de necesitarse tratamiento prolongado, debe usarse un preparado menos potente.

HEXODERM MICONAZOL

Miconazol+betametasona

Bactericida tópico

antiinflamatorio antimicótico

- Crema x 20 gr.

HEXODERM NEOMICINA

Neomicina, betametasona

Antibacteriano tópico

antiinflamatorio

- Crema x 20 gr.

COMPOSICIÓN.

Cada gramo de crema contiene: valerato de betametasona 1mg, sulfato de neomicina (equiva-

lente a 3,5mg de neomicina base) 5mg, excipientes cs.

PROPIEDADES.

Es altamente efectivo gracias a la suma de las acciones de sus componentes brindando actividad antialérgica, antiinflamatoria, antiprurítica, bactericida de amplio espectro y vasoconstrictora. Permite el rápido alivio de la inflamación y el prurito como asimismo la rápida remisión de la infección bacteriana.

INDICACIONES.

Está indicado en el tratamiento de las manifestaciones alérgicas, inflamatorias y pruriginosas de la piel cuando exista o se sospeche de infección o sobreinfección bacteriana.

MODO DE USO.

Aplicar una capa fina en las áreas afectadas 2 a 3 veces por día, esparciéndola cuidadosamente para una mejor penetración en la piel.

CONTRAINDICACIONES.

HEXODERM NEOMICINA como todos los preparados que contienen corticoides tópicos está contraindicado en tuberculosis cutánea, lesiones de sífilis, varicela y vacunas.

EFFECTOS COLATERALES.

Al igual que con todos los preparados que contienen corticoides tópicos pueden presentarse algunas de las reacciones siguientes: enrojecimiento, picazón, prurito, sequedad, foliculitis, hipertrichosis, hipopigmentación y erupciones acneiformes.

PRESENTACIÓN.

Pomo con 20g de crema.

HEXODERM SALIC ^{ETICOS}

Ácido salicílico, betametasona dipropionato

Antipruriginoso-queratolítico-antiinflamatorio

- Crema x 20 grs.