

HIDROCLOROTIAZIDA 25MG

POLIMED DISTRIBUIDORA LA

POLICLINICA

Hidroclorotiazida

Antihipertensivo

- Caja x 30 comp.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Hipertensión arterial: como monofármaco o asociado a otros antihipertensores (Betabloqueantes, vasodilatadores, antagonistas del calcio, IECA, reserpina). Edemas: debidos a insuficiencia cardíaca, renal y hepática leve o moderada; edemas premenstruales e idiópáticos. Diabetes insípida renal: cuando no esté indicado el tratamiento con hormona antidiurética. Hipercalciuria idiopática: como tratamiento preventivo de concreciones calcáreas urinarias.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a hidroclorotiazida (tiazidas en general) o a alguno de los excipientes. Anuria, insuficiencia hepática, insuficiencia renal severa (aclaramiento de creatina < 30mL/min), depleción electrolítica, diabetes descompensada, enfermedad de Addison. Embarazo y lactancia. Posología y modo de uso.

TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL: ADULTOS:

Inicialmente, se recomienda una dosis de 12,5 a 25 mg una vez al día, dosis que pueden aumentarse hasta 50 mg/día, en una o dos tomas. Los expertos recomiendan que si las dosis de 25 - 50 mg/día no controlan la hipertensión, no se deben aumentar las dosis de hidroclorotiazida, ya que no producen una mayor reducción de la presión arterial, pero en cambio aumentan la pérdida de potasio, sino añadir un segundo antihipertensivo. Cuando se utilice asociado a otros antihipertensivos, al inicio de la terapia debe disminuirse la dosis del agente hipotensor para evitar una hipotensión severa. Para ajustar la dosis, se debe administrar cada producto por separado hasta alcanzar la dosificación adecuada. Ancianos: usar las dosis de adultos, aunque las personas de la tercera edad pueden ser más sensibles a los efectos hipotensores de la hidroclorotiazida que las personas de edad media. Niños: de 1 a 2 mg/kg de peso corporal o de 30 a 60 mg/m² de superficie corporal 1 vez al día, como dosis única o en 2 tomas diarias, ajustando la dosificación de acuerdo a la respuesta, pueden recibir hasta 3 mg/kg/día. Lactantes

menores de 6 meses de edad pueden recibir hasta 3 mg/kg de peso corporal al día. Tratamiento del edema: Adultos: de 25 a 100 mg/día administrados en una o dos tomas. Muchos pacientes responden adecuadamente a un tratamiento intermitente (dosis en días alternos y tratamientos de 3 a 5 días/semana). En el tratamiento de la hinchazón y aumento de peso asociado al síndrome premenstrual se debe limitar a aquellas pacientes que muestren un aumento de peso > 1,4 kg. Ancianos: usar las dosis de adultos, aunque las personas de la tercera edad pueden ser más sensibles a los efectos de la hidroclorotiazida que las personas de edad media. Niños: la dosis recomendada es de 2 mg/kg/día administrados en dos veces. Pueden administrarse hasta 3 mg/kg/día. Lactantes menores de 6 meses de edad pueden recibir hasta 3 mg/kg de peso corporal al día. Tratamiento de la diabetes insípida: Adultos: se han utilizado dosis de 50 a 100 mg/día. Ancianos: usar las dosis de adultos, aunque pueden ser más sensibles a los efectos de la hidroclorotiazida y pueden necesitar dosis menores. Niños: dado que la experiencia en niños es escasa, la posología se determinará individualmente y en régimen hospitalario. Tratamiento de hipercalciuria: Adultos: se han utilizado dosis de 50 mg/día. Ancianos: usar las dosis de adultos, aunque pueden ser más sensibles a los efectos de la hidroclorotiazida y pueden necesitar dosis menores. Pacientes con disfunción renal: Aclaramiento de creatina > 30 mL/min: no se necesita reajuste de la dosis. Aclaramiento de creatina < 30 mL/min: la hidroclorotiazida no es efectiva en estos pacientes. Forma de administración: Los comprimidos deben tomarse por vía oral. Los comprimidos pueden tomarse enteros, partidos o triturados, con la ayuda de un poco de agua u otra bebida no alcohólica. Cuando se prescriba una única dosis diaria, ésta se tomará por la mañana, junto al desayuno