

INTELUZ DALLAS GAUTIER-DALLAS**Piracetam 800 mg***Nootropico*

• 800 mg. x 30 comp.

FORMULA

Cada comprimido recubierto de Inteluz® 800 contiene:
Piracetam 800 mg.
Excipientesc.s.p.

**INDICACIONES
TERAPEUTICAS**

Inteluz® 800 se halla indicado en el tratamiento de las alteraciones cognitivas agudas o crónicas de cualquier magnitud, cuando se desee mejorar o reestablecer el rendimiento intelectual afectado por causas psicológicas, neurológicas o seniles. Inteluz® 800 está indicado para reducir la progresión lesional y mejorar el funcionamiento neurológico y cognoscitivo en el tratamiento de alteraciones producidas por alcoholismo, toxicomanías, accidentes vasculares encefálicos y secuelas cerebrales postraumáticas o postquirúrgicas. Inteluz® 800 se halla indicado así mismo en el tratamiento de las dificultades del aprendizaje en niños y adolescentes y en el tratamiento del mioclonos de origen cortical.

**MECANISMO DE ACCION Y
DATOS FARMACOCINETICOS**

Inteluz® 800 presenta una acción protectora contra diversas toxas que actúan sobre el tejido cerebral y alteran sus funciones. Inteluz® 800 facilita la conectividad interhemisférica, lo cual mejora la transferencia de información intracerebral y potencia el aprendizaje y la memoria. Inteluz® 800 mejora la microcirculación reduciendo la adherencia de los eritrocitos lesionados a las células endoteliales. Su mecanismo de acción parece ser la estimulación de la actividad colinérgica cerebral, aunque también podrían hallarse involucrados otros neurotransmisores. Inteluz® 800 se absorbe en forma completa a partir del tubo digestivo, alcanzando concentraciones plasmáticas máximas 30 a 40 minutos. Su biodisponibilidad es de casi un 100%. La vida media de eliminación en voluntarios sanos es de 5 a 6 horas, pudiendo ser mayor en pacientes ancianos. Atraviesa la barrera hematoencefálica y se concentra en la sustancia gris encefálica.

POSOLOGIA

Adultos: Alteraciones cognitivas crónicas y lesiones neurológicas evolucionadas; 800 a 1600 mg tres veces al día.

Niños: Tratamiento de las dificultades de aprendizaje.

CONTRAINDICACIONES

No se han descrito.

**PRECAUCIONES Y
ADVERTENCIAS**

Como cualquier otro fármaco, Inteluz® 800 no deberá administrarse durante el primer trimestre del embarazo a menos que este justificado por una relación riesgo/beneficio favorable a la paciente.

**REACCIONES ADVERSAS Y
EFECTOS COLATERALES**

Inteluz® 800 es muy bien tolerado y rara vez produce efectos adversos. Se ha informado durante su empleo la aparición de vértigo leves, insomnio y náuseas, pero ninguno de estos efectos requieren en general la suspensión del tratamiento.

**INTERACCIONES
CON ALIMENTOS Y
MEDICAMENTOS**

Se ha reportado confusión, irritabilidad y trastornos del sueño durante el tratamiento concomitante con extracto tiroideo (T3 + T4).

El potencial de interacción medicamentosa resultó en cambios en la farmacocinética del piracetam la que se esperaba que fuera baja debido a que aproximadamente 90% de la dosis de piracetam se excreta sin cambios por la orina. Una dosis diaria de 20 g de piracetam por 4 semanas no modifica

los niveles séricos y los niveles pico de fármacos antiepilépticos (carbamazepina, fenitoína, fenobarbitona y valproato) en pacientes epilépticos que reciben dosis estables. La administración concomitante de

alcohol no tiene efecto sobre los niveles séricos de piracetam y los niveles de alcohol no se ven modificados por la administración de una dosis oral de 1,6 g de piracetam.

SOBREDOSIFICACION

En el caso de una sobredosificación aguda significativa el estómago puede ser vaciado por lavado gástrico o por inducción del vómito. No hay antídoto específico para el piracetam. El tratamiento de una sobredosis debe ser sintomático y puede incluir hemodiálisis. La eficacia de extracción del dializador es de 50 a 60% para piracetam.

PRESENTACION

Caja conteniendo 30 comprimidos recubiertos