

**KETOROLAC 60MG/2ML**

**POLIMED**

**DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA**

**Ketorolac trometamina**

*Analgésic, antiinflamatorio no esteroide*

- Caja 1 amp. x 2 mL.
- Caja 5 amp. x 2 mL.

**CONCENTRACIÓN:**

Cada 2 mL contiene:

Ketorolac Trometamina ...60 mg

**INDICACIONES  
TERAPÉUTICAS:**

Tratamiento de corto plazo del dolor postoperatorio agudo de moderado a severo. El Ketorolac no está indicado para el tratamiento de dolores crónicos.

**CONTRAINDICACIONES:**

Hipersensibilidad al Ketorolac. Embarazo, parto y lactancia. Menores de 16 años de edad. Debido a la falta de experiencia suficiente en el uso del Ketorolac en pacientes mayores de 65 años de edad, y hasta tanto no se disponga de mayor información, se contraindica su uso en dicho grupo etario. Insuficiencia hepática severa y/o insuficiencia renal moderada o severa. Úlcera gastroduodenal en evolución o con antecedentes de úlcera o hemorragia digestiva. Pacientes con hemorragias gastrointestinales o cerebrovasculares sospechadas o confirmadas; en aquéllos con diatesis hemorrágicas y en todos los que presentan anomalías de la hemostasis o en los que haya riesgo de hemorragias. Pacientes con hipovolemia o deshidratación aguda. Asma. Pacientes con antecedentes de alergia a otros antiinflamatorios no esteroideos, y en particular en aquéllos a quienes la Aspirina u otro inhibidor de la síntesis de prostaglandinas induzcan reacciones de tipo alérgico; como así también en aquéllos que presenten síndrome completo o parcial de pólipos nasales, angioedema y broncoespasmo.

**POSOLOGÍA Y MODO DE  
USO:**

La dosis diaria se adecuará a la intensidad del dolor, aceptándose como dosis diaria máxima 90 mg. Ampollas: uso por vía intramuscular o endovenoso: Se aconseja una dosis inicial de 10 mg con dosis subsiguientes de 10 a 30 mg cada 8 horas. Duración máxima del tratamiento: 2 días. De ser necesario puede continuarse el tratamiento por venoclisis, utilizando una dilución de 60 mg de Ketorolac en 500 mL de solución fisiológica o dextrosa al 5 %. Esta dilución corresponde a 0,12 mg de

Ketorolac por mililitro. En los pacientes que han recibido el Ketorolac inyectable y que sean transferidos a comprimidos de 10 y 20 mg, la dosis diaria combinada no debe exceder los 90 mg. En todos los casos deber respetarse la dosis máxima diaria indicada.