

LAXABIN NF DALLAS

Picosulfato sodico, simeticona

Laxante, antiflatulento

- Gotas x 15 mL.

FÓRMULA:

Cada mL. de solución Gotas Orales contiene:

Simeticona.....3 mg.
Picosulfato de Sodio.....7,5 mg.
Excipientes.....c.s.p.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Laxante suave - Antiflatulento

MECANISMO DE ACCIÓN Y DATOS FARMACOCINÉTICOS:

La simeticona es una silicona inerte derivada del silicio, desprovista de acción sistémica que desarrolla un efecto espumolítico, antiflatulento al actuar como tensioactivo, disminuyendo la tensión superficial de las islas espumantes o burbujas de moco y aire localizadas en el tracto gastrointestinal. A raíz de ello se produce la liberación de gas por vía oral (eructos) o rectal (flatos) aliviando la distensión y el meteorismo digestivo.

Farmacocinética:

La simeticona es insoluble en agua y en lípidos por lo que no es absorbida en el tracto digestivo.

El Picosulfato de Sodio es un laxante suave de acción directa sobre el tono y el peristaltismo del intestino grueso. Es absorbido en el intestino delgado y se transforma en el intestino en emodinas y es excretado por el riñón

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Está indicado para el tratamiento de la constipación intestinal cualquiera sea su etiología, por sobrepeso, embarazo, sedentarismo y reposo prolongado. Está indicado para la dispepsias, fermentación intestinal, aerofagia, aerocolia, flatulencia gastrointestinal. Para vaciamiento intestinal previo estudios radiológicos o cirugías. Dietas inadecuadas (pobres en celulosas). Enfermedades ano rectales donde sea preciso lograr deposiciones de consistencia blandas. Constipación senil. Constipación de los viajes cambio de hábitat.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a algunos de sus componentes. Patologías gastrointestinales, extrapiramidalismo medicamentoso, insuficiencia renal grave. No debe ser usado cuando existen dolores abdominales.

PRECAUCIONES Y

ADVERTENCIAS:

No debe usarse en paciente con enfermedades inflamatorias del tracto gastrointestinal. Su empleo crónico puede generar dependencia intestinal o disminución de la función intestinal normal. Se deberá tener precaución si se ingieren bebidas alcohólicas u otros depresores de SNC, como también si aparece somnolencia, durante la medicación se deberá analizar la relación riesgo-beneficio durante el periodo de lactancia ya que se excreta en la leche materna. No debe usarse en niños menores de 4 años de edad. No se han realizado estudios que confirman la inocuidad de este fármaco durante el embarazo.

POSOLOGÍA:

La dosis ideal debe ser buscada para cada paciente no obstante como dosis inicial en adultos se administrará 5 a 10 gotas, pudiendo la misma ser aumentada o disminuida a razón de una gota diaria hasta encontrar la optima. En niños mayores de 4 años la dosis inicial será de 2 a 5 gotas. Se debe administrar el producto por la noche con mucho líquido. Puede ser usado en enemas a razón de 20 a 30 gotas en el líquido a ser introducido.

INTERACCIÓN CON ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS:

El uso simultáneo con alcohol u otros depresores del SNC, pueden aumentar los efectos opresores del SNC.

Aumenta la pérdida de Potasio ocasionado por otras drogas, como por ejemplo los diuréticos. Los antibióticos, pueden reducir el efecto laxante del picosulfato de Sodio. Acelera la absorción de Mexiletina.

SOBREDOSIFICACIÓN:

Será incidencia rara la aparición de síntomas por sobredosis. Pero puede producir confusión, somnolencia severa efectos extrapiramidales que desaparezcan disminuyendo la dosis o suprimiendo el medicamento. También puede aparecer dolor espástico del abdomen inferior, con evacuaciones frecuentes.

RESTRICCIONES DE USO:

Intolerancia al medicamento. Enfermedad de Parkinson e insuficiencia renal grave. En pacientes con enfermedades inflamatorias del tracto gastrointestinal. No debe usarse en niños menores de 4 años de edad.

PRESENTACIÓN:

Caja conteniendo frasco gotero x 15 mL. de Solución Gotas

Orales.