

**Sumatriptán***Antijaquecoso*

- 6 mg. x 2 amp.

**FORMULA:**

LIBITUM ampollas subcutáneas:  
Cada ampolla subcutánea contiene:

Sumatriptán .....6mg  
Excipientes..... c.s.

**ACCION TERAPEUTICA:**

Estudios clínicos recientes han demostrado que este Agonista selectivo de los receptores tipo 5-HT<sub>1</sub> es efectivo en el tratamiento de todos los síntomas del ataque agudo de migraña. LIBITUM ejerce una vasoconstricción sustancial de las arterias cerebrales medias dilatadas del lado de la cabeza donde se produce el dolor durante el ataque agudo de migraña sin afectar las arterias, del lado no afectado, ni la de ambos lados en los días sin ataques.

EL SUMATRIPTAN es por lo tanto específico de los receptores tipo 5-HT<sub>1</sub>, los cuales regulan selectivamente la vasoconstricción de determinados vasos sanguíneos, sin efectos sobre los receptores subtipo 5-HT<sub>2</sub> ó 5-HT<sub>3</sub>.

Los pacientes mostraron un completo alivio del dolor, a los 10 ó 15 minutos después de la inyección subcutánea.

El tratamiento mejoró no solo el dolor de cabeza sino también los otros síntomas como las náuseas y vómitos.

Terapia del síndrome de la jaqueca.

LIBITUM está indicado para el tratamiento intermitente a corto plazo tanto de la migraña como de las cefaleas en racimo. No usar profilácticamente

**CONTRAINDICACIONES:**

No debe ser usado en pacientes con antecedentes de infarto de miocardio.

No debe ser utilizado en pacientes con cardiopatías isquémicas/Angina de PRINZMETAL/ Vasoespasma coronario.

**PRECAUCIONES:**

Esperar 24 horas para comenzar el tratamiento con LIBITUM si el paciente ha ingerido ergotamina y viceversa.

Se recomienda tener precaución si el paciente opera vehículos motorizados o maquinarias. No se recomienda su uso en pacientes con hipertensión arterial no controlada.

**INTERACCIONES:**

No existe evidencia de interacciones con el propranolol, flunarizina, dihidroergotamina, pizotifeno o alcohol.

**EFFECTOS COLATERALES:**

Se han observado casos de rubor, cosquilleo o pesadez ocasionalmente.

Dolor en el sitio de la inyección.

**POSOLOGIA:**

LIBITUM, debe ser administrado por una inyección subcutánea de 6 mg. La respuesta clínica comienza normalmente de 10 a 15 minutos, después de la aplicación.

Si los síntomas vuelven, una segunda dosis de LIBITUM puede ser inyectada al transcurrir por lo menos una hora después de la primera dosis. No más de 12 mg (2 ampollas de LIBITUM) deben ser administradas en un período de 24 horas.

**PRESENTACION:**

LIBITUM AMPOLLAS  
SUBCUTANEAS.

Envase contenido 2 ampollas.

**CONDICION DE CONSERVACION:**

Mantener a temperatura ambiente.

Proteger de la luz solar.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

**VENTA BAJO RECETA**

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Toxicología del Hospital de EMERGENCIAS MEDICAS, tel.: 220-418 o el 204-800 (int. 011).

Este medicamento debe ser usado únicamente por prescripción médica y no podrá repetirse sin nueva indicación del facultativo. En caso de uso de este medicamento sin prescripción médica, la ocurrencia de efectos adversos e indeseables será de exclusiva responsabilidad de quien lo consuma.

Si UD. tiene alguna duda, comentario o sugerencia acerca de este producto, llámenos al Tel.: 645-323 o envíenos un mail a hpar@hparsa.com, nuestros asesores le brindaran la información requerida de Lunes a Viernes de 7:30 a 17:00 horas, en 21 de Septiembre c/ Leonismo Luqueño, Luque - Paraguay