

Atorvastatina calcica amorfa
Hipocolesterolemia.

- 10 mg. x 30 comp. recub.
- 20 mg. x 30 comp. recub.
- 40 mg. x 30 comp. recub.

PRESENTACIÓN

Envase con 30 Comprimidos

INDICACIONES

Lipox está indicado para la reducción de los niveles sanguíneos de colesterol total, Colesterol-LDL, apolipoproteínas B y triglicéridos en pacientes con hipercolesterolemia primaria (heterocigota familiar y no familiar), y dislipidemia mixta, en quienes las medidas dietéticas no han surtido efecto

DOSIS

Se debe instaurar una dieta baja en colesterol y otras medidas dietéticas antes de iniciar el tratamiento con Lipox. Iniciar el tratamiento con 10 mg de Lipox una vez al día. La dosis se debe ajustar a las necesidades de cada individuo, según los niveles de Colesterol-LDL de base y la respuesta del paciente controlada después de 4 semanas. La dosis diaria puede tomarse a cualquier hora del día con o sin los alimentos. Las dosis pueden llegar como máximo, hasta 80 mg al día; estas cantidades se han usado para casos especiales, como hipercolesterolemia familiar homocigota.

ADVERTENCIAS Y/O PRECAUCIONES

Antes de iniciar el tratamiento, se debe someter al paciente a una dieta adecuada, ejercicios y reducción de peso en personas obesas para evaluar la cuantía de la hipercolesterolemia. Individuos con alto consumo de alcohol o con antecedentes de enfermedad renal o hepática: controlar las funciones hepáticas. Si en el curso del tratamiento las transaminasas séricas aumentan sus niveles hasta 3 veces los valores normales, se debe reducir la dosis o puede ser necesario discontinuar el tratamiento. Los pacientes deben avisar de inmediato a su médico si sienten dolor, debilidad o sensibilidad muscular inexplicable. Algunos pacientes pueden presentar elevación de las transaminasas séricas, que después del tratamiento vuelven a niveles normales. Mujeres en edad fértil, deben ser advertidas de los posibles daños al feto que la Atorvastatina puede ocasionar.

DISTRIBUCIÓN

Bajo Receta en Farmacias.

