

**Clorhidrato de ambroxol***Mucolítico*

- 15mg. Susp. ped. fco. x 100 mL.
- 30 mg. comp. caja x 20
- 30mg. Susp. adu. fco. x 100 mL.

**COMPOSICIÓN**

Cada comprimido contiene:

Ambroxol 30 mg.

Cada 5 mL de solución adulto contiene:

Ambroxol 30 mg.

Cada 5 mL de solución infantil contiene:

Ambroxol 15 mg.

**PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS**

Ambroxol es un metabolito de la bromhexina, que posee efecto expectorante. Posee además la propiedad de disminuir la viscosidad de la secreción bronquial, mediante la fragmentación de los mucopolisacáridos.

**INDICACIONES**

Alivio de la tos productiva (con secreción o flema). No debe utilizarse para el alivio de la tos crónica producida por el cigarrillo, asma, enfisema o tos seca.

**POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN**

Jarabe pediátrico: Niños hasta dos años: 2,5 mL (½ cucharadita) dos veces al día. Niños de 2 a 5 años: 2,5 mL (½ cucharadita) tres veces al día. Niños de 5 a 12 años: 5 mL (1 cucharadita) tres veces al día. Jarabe adultos: Adultos y niños mayores de 12 años: 5 mL (1 cucharadita) dos a tres veces al día. Niños de 6 a 12 años: 2,5 mL (½ cucharadita) tres veces al día. Comprimidos: Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido dos a tres veces al día. Muxol inyectable: Para uso parenteral (I.M., I.V. ó S.C.): Niños hasta 2 años: 1,6 mg/kg ó ½ ampolla repartido en dos dosis. Niños de 2 a 5 años: 1,25 mg/kg ó ½ ampolla tres veces al día. Niños mayores de 5 años: 1,2 mg/Kg ó 1 ampolla dos a tres veces al día. Adultos y niños mayores de 12 años: 1 a 2 ampollas dos a tres veces al día. Se puede administrar en infusión gota a gota con solución fisiológica de glucosa, levulosa o ringer (no mezclar con soluciones alcalinas por riesgo de precipitación de la droga).

**CONTRAINDICACIONES**

Hipersensibilidad a la bromexina, por la posibilidad de alergia

cruzada. No administrar en el primer trimestre del embarazo.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS**

Usar con precaución en pacientes con antecedentes de convulsiones, úlcera duodenal, diarrea. Usar con precaución en embarazo y lactancia.

**REACCIONES ADVERSAS**

Ocasionalmente pueden presentarse signos gastrointestinales. Rinorrea, prurito y sequedad de la boca.

**SOBREDOSIFICACIONES**

Debido a su baja toxicidad, no se han descrito reacciones de intoxicación.

**ALMACENAJE**

Almacenar por debajo de los 25°C. Protegido de la luz y la humedad (comprimidos). Protegido de la luz. No refrigerar (jarabe). Protegido de la luz (inyectable).

**PRESENTACIÓN**

Envase con 20 comprimidos. Frasco con 100 mL de jarabe adulto. Frasco con 100 mL de jarabe pediátrico.