

NEO ALERTOP

CHILE-MATHER COMPANY

Levocetirizina diclorhidrato

Antialérgico, antihistamínico

- Caja x 30 comp. rec.
- 2,5mg/5mL. sol. oral caja x fco. x120mL. + jeringa dosificadora
- Sol. got. caja x 1 fco. got. x 20mL

PRESENTACIÓN

Caja con 30 comprimidos recubiertos

Frasco de vidrio con 120 mL, Jarabe

Frasco de vidrio con 20 mL, Jarabe

INDICACIONES

La levocetirizina está indicada

en el tratamiento de los síntomas asociados a enfermedades alérgicas como: Rinitis alérgica estacional (incluyendo los síntomas oculares); Rinitis alérgica perenne y urticaria crónica idiopática

DOSIS

El comprimido recubierto se administra en forma oral, tragándolo entero con ayuda de líquidos, y se puede tomar tanto en ayunas como con alimentos. Adultos y adolescentes a partir de 12 años: La dosis diaria recomendada es de 5mg (1 comprimido recubierto). Se recomienda ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal moderada (Clearance 30-49): 1 comprimido cada 2 días; severa (clear-

ance menor a 30): 1 comprimido cada 3 días. enfermedad renal terminal (clearance menor a 10): contraindicado. Niños de 6 a 12 años: La dosis diaria recomendada es de 5mg (1 comprimido recubierto)

ADVERTENCIAS Y/O PRECAUCIONES

Evitar el consumo de alcohol. Vigilar a los pacientes que reciben medicación neuroleptica o sedante, alertar que si se maneja vehículo, o se operan máquinas no debe sobrepasar la dosis recomendada

DISTRIBUCIÓN

Bajo Receta en Farmacias