

NOVO THIDOXOL ETICOS

Cefazolina

Antibiótico cefalosporínico

- Caja x 1 fco. amp. con polv. este. para iny. + 1 amp. de disolv. x 5 mL.

COMPOSICIÓN.

Cada frasco ampolla contiene:
Cefazolina sódica 1g.

PROPIEDADES.

Es un antibiótico cefalosporínico semisintético para administración parenteral mediante inyección intramuscular o intravenosa. Ha demostrado actividad antibiótica bactericida ante los siguientes organismos: estafilococos, neumococos, gonococos, estreptococos (betahemolíticos y otros), *Haemophilus influenzae*, *Escherichia coli*, *Klebsiella* y *Proteus mirabilis* in vitro; y ante *Treponema pallidum* in vivo. Ha demostrado actividad ante todas las cepas de estreptococos, neumococos y estafilococos penicilinorresistentes.

INDICACIONES.

Está indicado en todas las infecciones a gérmenes grampositivos o gramnegativos que requieran un tratamiento antibiótico inyectable, como: bronco-pleuro-neumopatías agudas y crónicas de todo tipo; infecciones otorrinolaringológicas y estomatológicas; infecciones urogenitales (ya que NOVO THIDOXOL se elimina por la vía renal bajo forma activa no metabolizada); infecciones osteoarticulares y de los tejidos blandos; infecciones ginecológicas, obstétricas y particularmente prevención de las infecciones fetales en caso de ruptura prematura de mem-

branas; infecciones quirúrgicas y viscerales por estafilococos. También está indicado en bleenorragia y sífilis primaria. Está indicado en pediatría y especialmente en lactantes y prematuros, ya que no está sometido a metabolización hepática.

DOSIFICACIÓN.

Debe ser disuelto para su inyección intramuscular o intravenosa: para la dosis de 1g se debe disolver en 5mL de solvente. NOVO THIDOXOL acompaña en sus presentaciones el solvente adecuado en la cantidad adecuada. Se sugiere inyectar en forma intravenosa lenta o en las grandes masas musculares. La dosis usual para un adulto, en infecciones de moderada severidad es de 0,5g a 1g, 3 veces al día. Reacciones más severas pueden necesitar hasta 4 veces al día. Pueden administrarse hasta 12g diarios en el adulto gracias a la baja nefrotoxicidad de la droga. En niños la dosis en infecciones de moderada severidad es de 30 a 50mg por kilo de peso por día. Para infecciones de severa intensidad la dosis será de 50 a 100mg por kilo de peso por día. Puede usarse en perfusión, siendo compatible con los líquidos intravenosos más comúnmente usados.

CONTRAINDICACIONES.

Está contraindicado en aquellas personas que han demostrado hipersensibilidad a ésta u otra cefalosporina. Los antibióticos, incluyendo NOVO THIDOXOL, deben ser administrados con cautela en pacientes que han

demostrado algún tipo de alergia, especialmente medicamentosa. Está contraindicado en insuficiencia renal.

EFFECTOS COLATERALES.

En casos de hipersensibilidad pueden presentarse urticaria, rashes eritematosos y maculopapulares, reacciones anafilácticas, fiebre y eosinofilia. Otras reacciones se han informado en pacientes con historia de alergia particularmente a la penicilina (en sangre, hígado, función renal, etc.). El paciente deberá informar inmediatamente a su médico en caso de sentir cualquier reacción o sensación desagradable debido al tratamiento.

ADVERTENCIAS.

Antes de ser instituida una terapia con antibióticos cefalosporínicos deberá efectuarse una reacción previa de hipersensibilidad a cefalosporinas y penicilinas. Los derivados cefalosporínicos deben ser administrados con cautela a pacientes penicilinosensibles. NOVO THIDOXOL debe administrarse con precaución asociado con otros antibióticos con potencial nefrotóxico como gentamicina, kanamicina, polimixina B y colistina.

PRESENTACIÓN.

Env. 1g y amp. de 5mL de solv.