

NOVOTEARS SAVAL

Nafazolina

Lágrimas descongestionantes

- Fco. gotario 10 mL.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de solución oftálmica estéril contienen:

Nafazolina HCl.....0,012 g.

Hipromelosa.....0,3 g.

Dextran.....0,1 g.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

NOVOTEARS es la asociación de un descongestionante con efecto vasoconstrictor local y dos polisacáridos, cuya acción permite estabilizar y preservar la lágrima lubricando y protegiendo la superficie ocular.

INDICACIONES

Alivio temporal del enrojecimiento del ojo debido a irritaciones oculares menores. Se utiliza en todas las condiciones en que se desee un alivio de la irritación, ardor, prurito y/o congestión ocular debido a polvo, humo, smog, exposición solar, viento, lentes de contacto, alergias, resfríos, natación, televisión excesiva y trabajo visual intenso.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Dosis usual: aplicación tópica ocular de 1 a 2 gotas en el ojo afecta-

do, 3 a 4 veces al día, o con menor frecuencia, de acuerdo a evolución e intensidad de los síntomas. El tratamiento generalmente no debe superar los 4 días, salvo indicación médica.

CONTRAINDICACIONES

NOVOTEARS, está contraindicado en personas con antecedentes de hipersensibilidad a alguno de sus componentes y en personas con glaucoma de ángulo estrecho.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No se aconseja su uso en niños menores de 2 años. Debe utilizarse con precaución durante embarazo y lactancia, y en pacientes con anomalías cardiovasculares, hipertensión, diabetes e hipertiroidismo. Nafazolina puede producir midriasis cuando es aplicada sobre la conjuntiva, pero ese efecto usualmente es mínimo con las concentraciones usadas en descongestionantes oculares. NOVOTEARS está indicado sólo para uso oftálmico tópico. El sobreuso de este producto u otro vasoconstrictor puede producir incremento de la irritación. Retirar los lentes de contacto antes de su uso. El uso en lactantes y niños puede causar depresión en el SNC, coma y marcada disminución de la temperatura corporal. Si la irritación

y/o enrojecimiento, se mantiene o aumenta, se debe discontinuar su uso. Si la solución cambia de color o se torna turbia, no utilizar.

REACCIONES ADVERSAS

Las reacciones adversas en el uso tópico oftálmico son poco frecuentes y de baja intensidad. Se ha reportado dilatación pupilar, aumento de la presión intraocular e irritación local pasajera. Pueden presentarse ocasionalmente efectos sistémicos tales como hipertensión, irregularidades cardíacas e hiperglicemia.

INTERACCIONES

Pacientes que se encuentran bajo inhibidores de la MAO o antidepresivos tricíclicos pueden experimentar crisis de hipertensión.

SOBREDOSIFICACIONES

No se ha descrito.

ALMACENAJE

Almacenar por debajo de los 30°C. Protegido de la luz.

PRESENTACIÓN

NOVOTEARS: Frasco gotario sellado con 10 mL de solución oftálmica estéril.