

OFTASONA N SAVAL

Betametasona fosfato disódico, Neomicina *Corticosteroide oftálmico*

- Sol. oftal. x 10 mL.
- Ungüento x 3 gr.

COMPOSICIÓN

Solución oftálmica:

Cada 100 mL de solución oftálmica estéril contienen:

Betametasona fosfato disódico 0,1 g.

Neomicina (como sulfato) 0,35 g.

Ungüento oftálmico:

Cada 100 g de ungüento oftálmico contiene:

Betametasona fosfato disódico: 0,1 g.

Neomicina: 0,35 g.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

OFTASONA-N es una asociación de dos principios activos: un potente corticoide y un antibiótico aminoglicósido de amplio espectro. La combinación de estos dos principios activos, constituye una terapia útil en el tratamiento de afecciones oculares que se caracterizan por la presencia de un componente infeccioso y una respuesta inflamatoria.

INDICACIONES

Afecciones alérgicas e inflamatorias con infección sobregregada. En infecciones que cursen con inflamación ocular provocadas por traumatismo, infección alérgica u otros irritantes. Profilaxis y tratamiento de los procesos inflamatorios e infecciosos en el pre y post operatorio. También indicado en blefarconjuntivitis de origen estafilocócico, conjuntivitis infecciosa alérgica, orzuelos, penetración de cuerpos extraños y queratitis infecciosa no específica.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN DOSIS SUGERIDA:

1 gota dos a cuatro veces al día en el ojo afectado o aplicación tópica del ungüento oftálmico dos a cuatro veces al día en el ojo afectado. Se sugiere usar el colirio durante el día y el ungüento en la noche.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a los principios activos. En casos de infecciones micóticas del ojo, infecciones oculares purulentas agudas, úlceras de la córnea y glaucoma, herpes simple agudo, vaccinia secundaria o inoculada y enfermedades virales de la córnea y la conjuntiva.

PRECAUCIONES Y

ADVERTENCIAS

No administrar en forma indiscriminada sin control médico, ya que el uso por períodos prolongados puede producir aumento de la presión intraocular y posterior formación de cataratas.

REACCIONES ADVERSAS

Se puede producir irritación y ardor. Ocasionalmente en tratamientos prolongados, puede producirse aumento de la tensión intraocular con posible desarrollo de glaucoma y daño al nervio óptico.

INTERACCIONES

No se han descrito.

SOBREDOSIFICACIONES

No se ha descrito.

ALMACENAJE

Almacenar por debajo de los 30°C (ungüento). Protegido de la luz (solución).

PRESENTACIÓN

Frasco gotario sellado con 10 mL de solución oftálmica estéril. Pomo con 3 g de ungüento.

OFTASONA P SAVAL

Betametasona fosfato sódico *Corticosteroide oftálmico*

- Sol. oft. fco. x 10 mL.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de solución oftálmica estéril contiene:

Betametasona fosfato disódico 0,1 g.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

Betametasona es un corticoesteroide, que administrado por vía ocular tiene la propiedad de suprimir la inflamación de los tejidos, disminuyendo la intensidad de la vasodilatación, hiperemia, exudación e infiltración leucocitaria. Tiene además la capacidad de disminuir la respuesta alérgica de los tejidos.

INDICACIONES

Tratamiento de las afecciones alérgicas e inflamatorias del segmento anterior del ojo: conjuntivitis, blefaritis, queratitis, iritis, escleroqueratitis, blefarconjuntivitis, eczema palpebral.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

1 gota dos a cinco veces al día.

CONTRAINDICACIONES

Infecciones micóticas del ojo, infecciones oculares purulentas agudas, úlceras de la córnea y glaucoma, herpes simple agudo, vaccinia secundaria o inoculada y enfermedades virales de la córnea y la conjuntiva.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No administrar en forma indiscriminada sin control médico, ya que el uso por períodos prolongados puede producir aumento de la presión intraocular.

REACCIONES ADVERSAS

Ocasionalmente en tratamientos prolongados, puede producirse aumento de la tensión intraocular y cataratas.

INTERACCIONES

No se han descrito.

SOBREDOSIFICACIONES

No se ha descrito.

ALMACENAJE

Almacenar por debajo de los 30°C. Protegido de la luz.

PRESENTACIÓN

Frasco gotario sellado con 10 mL de solución oftálmica estéril.