

PRURISEDAN CREMA

ANDROMACO

Difenhidramina clorhidrato calamina (ME)

Antipruriginoso

- Caja pomo x 30 g.

COMPOSICIÓN:

Cada 100g contiene:
Difenhidramina Clorhidrato 1,0g;
Calamina 8,1g; Excipientes.

ACCIÓN TERAPEUTICA:

Antipruriginoso, antihistamínico.

INDICADO PARA:

Prurisedán Crema alivia el prurito en dermatosis alérgicas y pruriginosas, eritema solar, picaduras de insectos, dermatitis de contacto, irritaciones de la piel.

MODO DE USO:

Adultos y niños mayores de 2 años: Extender sobre el área afectada 3 ó 4 veces por día, salvo indicaciones médica.

Niños menores de 2 años: Consultar al médico para su uso. Usar agua y jabón para remover la crema.

Precauciones y advertencias: Evitar la aplicación sobre la piel ampollada o áreas de la misma que estén supurando.

No aplicar sobre extensiones amplias, salvo indicación médica.

No emplear ningún otro medicamento que contenga Difenhidramina mientras dure el tratamiento con este producto. Evitar el contacto con los ojos y mucosas.

Suspender el tratamiento si se tiene sensación de ardor o en caso de aparecer salpullido.

Si los síntomas de prurito o picazón persisten luego de un tratamiento de 7 días, consultar con el médico.

Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

PRESENTACIÓN: 30G

PRURISEDAN INCOLORO

ANDROMACO

Clorhidrato de difenhidramina, óxido de zinc Antipruriginoso antihistamínico tópico

- Loción fco. x 60 mL.

FÓRMULA

Cada 100 mL. contiene:
Difenhidramina
Clorhidrato.....1 g.
Óxido de zinc..... 2 g.
Excipientes.....
(Alcanfor, Glicerina, Sorbitol 70%, Hidroxiethylcelulosa, Alcohol etílico, Agua Purificada) c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antipruriginoso, antihistamínico

INDICACIONES:

La loción proporciona alivio frente al prurito producido por quemaduras de sol, picaduras de insectos, reacciones alérgicas a diversas plantas, pelos de animales domésticos y diversas irritaciones de la piel.

MODO DE USO

Adultos y niños mayores de 2 años: Lavar la zona afectada de la piel con agua y jabón. Secar. Aplicar la loción sobre la misma con un suave masaje. Repetir la aplicación 3 ó 4 veces por día, salvo indicación médica.

Niños menores de 2 años: Consultar con el médico para su uso.

Agitar antes de usar.

Usar agua y jabón para remover la loción.

Esta medicación no mancha la ropa.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Evitar la aplicación sobre la piel ampollada o áreas de la misma que estén supurando.

No aplicar sobre extensiones amplias, salvo indicación médica.

No emplear ningún otro medicamento que contenga Difenhidramina mientras dure el tratamiento con este producto. Evitar el contacto con los ojos y mucosas.

Suspender el tratamiento si se tiene sensación de ardor o en caso de aparecer salpullido.

Si los síntomas de prurito o picazón persisten luego de un tratamiento de 7 días, consultar con el médico.

Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

CONTRAINDICACIONES:

Pacientes con antecedentes de alergia o cualquiera de los componentes de este producto.

SOBREDOSIFICACIÓN

En caso de intoxicación accidental se debe consultar de inmediato al médico o comunicarse con Centros de Toxicología.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Conservar a temperatura ambiente menor de 30°C

PRESENTACIÓN

Frasco x 60 mL

PRURISEDAN POLVO

ANDROMACO

Acido bórico, óxido de zinc

Antipruriginoso antiséptico

- Talquera con 60 g

FÓRMULA

Cada 100 g. contiene:
Acido Bórico.....5,0 g.
Óxido de zinc16,0 g.
Alcanfor.....0,5 g.
Excipientes (Estearato de Zinc 5,0 g; Fenol 0,5 g; Almidón c.s.)

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antipruriginoso, antiséptico, astringente.

INDICACIONES

Tratamiento de lesiones pruriginosas húmedas, rezumantes y ampollares.

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS/ PROPIEDADES

Acción farmacológica: PRURISEDAN Polvo, a través de sus componentes, actúa como antiséptico y antipruriginoso.

El Óxido de Zinc se adhiere a la superficie cutánea inflamada o lesionada, formando una capa que impide la irritación por el aire, la fricción de la ropa y de las superficies cutáneas opuestas. Disminuyen el prurito y el ardor y poseen efectos secantes. También ejercen acción inflamatoria.

El Alcanfor es un antiséptico débil y posee ligera acción anestésica local.

Por su parte el Acido Bórico disminuye el pH de la piel como agente bacteriostático y se comporta como un antiinfeccioso local.

Farmacocinética: Se absorbe fundamentalmente a través de la piel dañada.

POSOLOGÍA

Espolvorear sobre el área afectada y repetir varias veces en el día si fuera necesario.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. No aplicar sobre heridas abiertas y/o infectadas, o procesos de la piel que no sean los enumerados en las indicaciones del mismo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Es para uso externo exclusivo. No debe utilizarse en procesos infecciosos o áreas extensas de la piel, excepto bajo control médico. No deberá emplearse sobre la piel dañada. Evitar el contacto con los ojos y mucosas.

REACCIONES ADVERSAS

Reacciones alérgicas.

SOBREDOSIFICACIÓN

En caso de intoxicación accidental se debe consultar de inmediato al médico o comunicarse con Centros de Toxicología.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Conservar a temperatura ambiente menor de 30° C.

PRESENTACIÓN

Talquera con 60 g

