

RECUPERAL FAPASA

**Cobalto sulfato nicotinamida
magnesio sulfato Potasio
sulfato cinc manitol calcio
pantotenato alfa tocoferol
tiamina aceites vegetales
ginseng calcio fosfato cobre
sulfato riboflavina ascórbico
ácido lecitina piridoxina**

Polivitamínico con minerales
• 30 caps. blandas

COMPOSICIÓN:

Cada cápsula contiene:

Aceite vegetal 407,655mg, lecitina de soja 17,55mg, vitamina A 2,471mg, vitamina D 2 1,1mg, DL-alfa tocoferol 25mg, extracto de ginseng 8,8mg, mononitrato de tiamina 8,8mg, riboflavina 3,9mg, clorhidrato de piridoxina 2mg, ácido ascórbico 43,5mg, ascorbato de nicotinamida 24,5mg, pantotenato de calcio 4mg, cianocobalamina 2mg, sulfato de magnesio anhidro 25mg, sulfato de cobalto 2mg, sulfato de cobre 3,514mg, fluoruro de Sodio anhidro 0,02mg, fumarato ferroso 20mg, sulfato de Potasio anhidro 5,24mg, rutina 20mg, sulfato de cinc 3,5mg, fosfato bicálcico anhidro 80mg, mezcla manitol-cera 134,25mg.

INDICACIONES:

Personas de edad madura y avanzada: prevención y tratamiento de las manifestaciones del envejecimiento, como capacidad intelectual y corporal reducidas, estados de extenuación y cansancio, desgano, falta de concentración, trastornos del sueño, rigidez senil, temor. Procesos involutivos específicos y estados carenciales de vitaminas y minerales propios de la vejez. Personas jóvenes y de mediana edad: situaciones de estrés físico y mental acompañado por déficit del poder de concentración, cansancio de aparición rápida, disminución del rendimiento. En general: como tratamiento coadyuvante de nutrición subcalórica, convalecencia retrasada, así como para la elevación de la resistencia en general.

DOSIFICACIÓN:

Dos cápsulas por día 2 a 3 semanas; una con el desayuno y la otra con el almuerzo. Posteriormente seguir con una cápsula diariamente con el desayuno. Se recomienda tomar durante algunos meses y, dado el caso, repetir la medicación después de una pausa. Los ancianos pueden tomar el preparado continuamente.

PRESENTACIÓN:

Env. con 30 cáps.

RECUPERAL E FAPASA

Ascórbico ácido ginseng

**vitamina B12 piridoxina
cobre sulfatonicotinamida
hierro fumarato riboflavina
cinc ergocalciferol calcio
carbonato calcio pantotenato
magnesio oxido rutina
manganeso sulfato cera de
abejas alfa tocoferol**

Polivitamínico con minerales

• Envase x 30 caps. blandas

COMPOSICIÓN:

Cada cápsula contiene: vitamina E (acetato de DL-alfa tocoferol) 210mg, vitamina A (acetato 2.800.000UI/g) 1,571mg, vitamina B 1 (mononitrato de tiamina) 7,2mg, vitamina B 2 (riboflavina) 4,29mg, vitamina B 6 (clorhidrato de piridoxina) 2,1mg, vitamina B 12 (cianocobalamina en manitol) 2,4mg, vitamina C (ácido ascórbico) 45,037mg, vitamina D (solución 400.000UI/g) 1,1mg, bitartrato de dietilamino-etanol 26mg, ascorbato de nicotinamida 24,937mg, pantotenato de calcio 7mg, fumarato ferroso 22,359mg, sulfato de cobre pentahidratado 4,358mg, sulfato de manganeso monohidratado 3,354mg, sulfato de Potasio anhidro 5,259mg, sulfato de cobalto heptahidratado 2,002mg, rutina 20mg, fluoruro de Sodio anhidro 0,02mg, óxido de cinc 1,768mg, extracto de ginseng coreano 30% ginseng 44mg, óxido de magnesio pesado 8,378mg, carbonato de calcio pesado PP malla 325 58,9mg, mezcla aceite de maní hidrogenado/cera de abejas 31,09mg, excipientes cs.

INDICACIONES:

En personas jóvenes, como complemento del suministro alimentario de vitaminas y sustancias minerales. En las situaciones de cansancio físico y mental que se acompañan de deficiente capacidad de concentración, fatigabilidad rápida, disminución del rendimiento intelectual o laboral. Durante tratamientos dietéticos o de adelgazamiento. En personas maduras y en la tercera edad que presentan manifestaciones de carácter involutivo, tales como disminución del rendimiento intelectual y físico, estados de fatiga y agotamiento, trastornos de la memoria, disminución de la capacidad de concentración, trastornos del sueño, distrofias cutáneas de la piel y del pelo. Este compuesto se encuentra indicado en cuadros de alteraciones nutricionales como síndromes de malabsorción, pacientes bajo régimen de nutrición parenteral, desnutrición crónica. También en cuadros infecciosos crónicos en pacientes de alto riesgo de neoplasias. En pacientes portadores de enfermedades virales con dis-

minución paralela del recuento de neutrófilos o con una neutropenia relativa.

DOSIFICACIÓN:

Una cápsula a la mañana y otra al mediodía junto con el desayuno y el almuerzo respectivamente. En caso de aparecer algún efecto secundario o disminución de la tolerancia, se aconseja disminuir a sólo una cápsula diaria con el almuerzo. Se aconseja mantener el tratamiento por un período de hasta 10 semanas o de acuerdo con el criterio médico.

PRESENTACIÓN:

Env. con 30 cáps. blandas.