REDOXON BAYER

Ascórbico ácido

Vitamínico

- 1 gr. x 10 comp. eferv.
- 2 gr. x 1 tubos x 30 comp. eferv.
- 2 gr. x 3 tubos x 10 comp. eferv.
- 2 gr. X 10 comp. eferv.
- Gotas x 20 mL.

PRESENTACIÓN:

Comprimidos efervescentes de 2 gr y 1 gr

Cada comprimido efervescente sabor limón con azúcar contiene vitamina C (ácido ascórbico) lg.en un excipiente de ácido tartárico 790 mg. bicarbonato de Sodio 1.000 mg. riboflavina 5'- fosfato sódico dihidrato 2 mg. sacarina sódica 16 mg. esencia de naranja 1 mg. esencia de naranja diluida 1 mg. esencia tetraroma de limón 0.2 mg y azúcar granular c.s.p. 4.400 mg.

COMPOSICION

Cada comprimido efervescente sabor limón con azúcar contiene vitamina C (ácido ascórbico) 2g.en un excipiente de ácido cítrico 520 mg., cloruro de Sodio 20mg., ciclamato de Sodio 99,59 mg, bicarbonato de Sodio 900 mg. , colorante amarillo de quinoleína 61,4 % 0,743 mg, esencia de naranja 25 mg. esencia de naranja diluida 1 mg. esencia de limón 75 mg y azúcar granular c.s.p. 4.600 mg.

Cada comprimido efervescente sabor naranja con azúcar contiene vitamina C (ácido ascórbico) 1g. en un excipiente de ácido tartárico 800 mg. bicarbonato de Sodio 1.000 mg. riboflavina 0.5 mg. sacarina sódica 20 mg. cloruro de Sodio 20 mg. apocaroteno 1% CWS 50 mg. esencia de naranja 80 mg. esencia de mandarina 10 mg y azúcar c.s.p. 4.600 mg.

Cada comprimido efervescente sabor naranja con azúcar contiene vitamina C (ácido ascórbico) 1g. en un excipiente de ácido tartárico 800 mg. bicarbonato de Sodio 1.000 mg. riboflavina 0.5 mg. sacarina sódica 20 mg. cloruro de Sodio 20 mg. apocaroteno 1% CWS 50 mg. esencia de naranja 80 mg. esencia de mandarina 10 mg y azúcar c.s.p. 4.600 mg.

Cada comprimido efervescente sabor naranja con azúcar contiene vitamina C (ácido ascórbico) l g. en un excipiente de ácido tartárico 800 mg. bicarbonato de Sodio 1.000 mg. riboflavina 0.5 mg. sacarina sódica 20 mg. cloruro de Sodio 20 mg. apocaroteno 1% CWS 50 mg. esencia de naranja 80 mg. esencia de mandarina 10 mg y azúcar c.s.p. 4.600 mg.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Prevención y tratamiento de los estados de carencia de vitamina C.

IINDICACIONES

COMPRIMIDOS EFERVESCENTES DE 2 GR

Prevención y tratamiento de los estados de carencia de vitamina C como escorbuto. pre-escorbuto y enfermedad de Moeller Barlow (escorbuto infantil). Requerimientos incrementados durante el embarazo y lactancia, así como en pacientes sometidos a diálisis. Metahemoglobinemia. Trastornos de absorción (gastroenteropatías). Terapia adyuvante en afecciones graves o crónicas

REDOXON GOTAS

-Carencia de vitamina C (preescorbuto, escorbuto, enfermedad de Moeller-Barlow).

- Requerimientos incrementados durante el embarazo y la lactancia, en los grandes fumadores, en casos de antibioticoterapia y de enfermedades infecciosas, después de una intervención quirúrgica, así como en pacientes sometidos a hemodiálisis.
- Suplemento de vitamina C en recién nacidos y prematuros.
- Metahemoglobinemia. Trastornos de absorción (gastroenteropatías).
- Terapia adyuvante en afecciones graves o crónicas.

POSOLOGÍA Y FORMAS DE ADMINISTRACIÓN

Comprimidos efervescentes 1g:

Adultos y mayores de 16 años La dosis habitual es de 1 g por día vla oral, siendo el rango de dosis de 1 a 3 g por día.

Comprimidos efervescentes 2g:

1 ó más comprimidos efervescentes por día, según criterio médico.

Redoxon gotas:

Adultos y adolescentes: En deficiencias de vitamina C y en trastornos gastrointestinales asociados con dificultades en la absorción: 500 mg - 1 g por día (aproximadamente 60 - 120 gotas).

Pacientes con requerimientos incrementados: 250 - 500 mg (30 y 60 gotas) por día son generalmente suficientes.

Niños: 50 - 200 mg por día (6 - 25 gotas), según la edad.

Lactantes: 30 - 50 mg por día (4 - 6 gotas).

Las gotas pueden tomarse con agua o con jugo de frutas. El frasco debe colocarse invertido, en posición vertical. Si las gotas no fluyen inmediatamente, agitar el frasco suavemente.

CONTRAINDICACIONES

REDOXON no debe ser administrado en pacientes con nefrolitiasis con oxaluria y un pH urinario ácido o fisiológico, ni en aquellos con hi-persensibilidad conocida a alguno de los componentes del producto, ni en casos de uremia y de hemocromatosis. No deberán usarse altas dosis durante el embarazo.

PRECAUCIONES

Dado que la vitamina C puede inducir una mayor absorción de hierro, se requiere prudencia en casos de hemocromatosis o de ciertas enfermedades como la B-talasemia. Los pacientes diabéticos y aquéllos con tendencia a padecer cálculos renales recurrentes (ejemplo: pacientes en diálisis). no deberían tomar dosis excesivas por periodos de tiempos prolongados.

A las dosis indicadas, no se requieren medidas de precauciones especiales.

EMBARAZO /LACTANCIA

Categoría de embarazo: A

No existe ningún indicio que sugiera que la vitamina C podría implicar algún tipo de riesgo durante los periodos de embarazo y lactancia.

EFECTOS ADVERSOS

Por lo general. se toleran dosis claramente superiores a los requerimientos fisiológicos sin la manifestación de ningún tipo de sintomatología. En algunos casos en que hubo una ingesta de dosis sumamente elevadas se ha observado un leve efecto diarreico y/o diurético. De acuerdo con las Investigaciones efectuadas más recientemente, no cabe esperar la formación de cálculos de oxalato cuando existe un tratamiento prolongado con dosis elevadas de vitamina C.

OBSERVACIONES ESPECIALES:

Influencia sobre los métodos de diagnóstico

La vitamina C puede obstaculizar la determinación de glucosa en la orina. sin influir sobre la glucemia. Antes de proceder a la determinación de la glucosuria será necesario suspender la administraci6n de vitamina C durante varios días. Cuando se investiga la presencia de sangre en las heces, la vitamina C puede llegar a producir un resultdo falso negativo.