

REDUSTEROL FAPASA

Atorvastatina cálcica

Hipocolesterolemizante

- 10 mg. x 30 comp. recub.
- 20 mg. x 30 comp. recub.
- 40 mg. x 30 comp. recub.

COMPOSICIÓN:

Cada comprimido recubierto contiene: Atorvastatina Cálcica trihidrato 10,82mg (equivalente a Atorvastatina 10mg), excipientes cs.

Cada comprimido recubierto contiene: Atorvastatina Cálcica trihidrato 21,65mg (equivalente a Atorvastatina 20mg), excipientes cs.

Cada comprimido recubierto contiene: Atorvastatina Cálcica trihidrato 40mg, excipientes cs.

INDICACIONES:

La Atorvastatina está indicada en el tratamiento de las hipercolesterolemias y dislipemias mixtas, como accesorio de una dieta restringida en grasas saturadas y en colesterol, para reducir los niveles de colesterol total y triglicéridos.

DOSIFICACIÓN:

La dosis recomendada es de 10mg a 20mg, 1 comprimido por día según criterio médico.

Concomitante con la administración de atorvastatina se recomienda el mantenimiento de una dieta pobre en grasas saturadas. Se recomienda el control de los niveles lipídicos a la 4 semana de iniciado el tratamiento y el ajuste de la dosis de acuerdo con los resultados obtenidos. La vía de administración es oral.

PRESENTACIÓN:

Env. con 20 y 30 comp. de 10mg.

Env. con 20 y 30 comp. de 20mg.

Env. con 30 comp. rec. de 40mg.