

ROWATINEX ROWA-DISTRIFARMA**Anetol pineno canfeno aceite de oliva borneol fenchona, cineol**

Antiinflamatorio antilitiasico

- Caja x 50 cáps. blandas gastroresistentes

FORMA FARMACEUTICA:

Cápsulas gastroentéricas de gelatina blanda, de forma esférica, conteniendo un aceite amarillo pálido.

CONDICIÓN DE VENTA:

Venta bajo receta.

PROPIEDADES:

ROWATINEX estimula la diuresis y relaja los espasmos del tracto urinario ayudando por lo tanto el pasaje de los cálculos. El efecto terapéutico de la equilibrada combinación de los terpenos reduce la inflamación del tracto urinario estimulando el flujo renal sanguíneo a través de los riñones y aumenta la producción de orina menos concentrada.

INDICACIONES:

ROWATINEX está indicado para el tratamiento de los espas-

mos del tracto urinario y la inflamación asociada con urolitiasis. ROWATINEX ayuda también en la disolución y expulsión de los cálculos en el sistema renal.

DOSIFICACIÓN**RECOMENDADA:**

ADULTOS: A no ser diferente-mente recomendado por el médico, la dosis habitual es de 1-2 cápsulas tres veces al día antes de las comidas. En caso de cólico 2-3 cápsulas 4-5 veces al día antes de las comidas.

NIÑOS: 6-14 años: La dosis habitual es de 1 cápsula dos veces al día antes de las comidas.

CONTRAINDICACIONES:

No se conocen contraindicaciones con el USO de ROWATINEX.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Se debe incrementar la toma de líquido durante la terapia. Solo se debe usar el producto con cautela en pacientes que estén siendo administrados con anticoagulantes o drogas dependientes del hígado para el metabolismo y excreción.

EMBARAZO Y LACTANCIA:

A pesar de que no se conocen efectos teratogénicos, no es aconsejable que las mujeres tomen ROWATINEX durante el primer trimestre del embarazo.

EFFECTOS COLATERALES:

No se han reportado efectos colaterales.

PRECAUCIONES FARMACEUTICAS:

Almacenar en lugar fresco y seco entre 15°C y 30°.

Guardar todas las medicinas fuera del alcance de los niños.

SOBREDOSIS:

En caso de sobredosis o indigestión accidental, consultar al Servicio de Toxicología del Hospital de Emergencias Médicas. Tel.: 220-418 ó 204-800 int. 11

CONDICION DE VENTA:

VENTA BAJO RECETA.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

ORAL.

PRESENTACIÓN:

Envase de 50 cápsulas en blister.