

SIMPERTEN

CHILE - MATHER COMPANY

Losartan

Antihipertensivo

- 50 mg. Caja x 30 comp. recub.
- 100 mg Caja x 30 comp. recub.

PRESENTACIÓN

Envase con 30 Comp

INDICACIONES

Tratamiento de la hipertensión arterial esencial sólo o asociado con otros agentes antihipertensivos, tales como diuréticos tiazídicos en bajas dosis.

DOSIS

Usualmente la dosis inicial y de mantención es 1 comprimido de 50 mg en una dosis diaria. El efecto antihipertensivo máximo se logra 3 a 6 semanas después del inicio de la terapia. Una dosis diaria inicial de 25 mg debe ser considerada en pacientes con depleción de volumen intravascular (ej. los tratados con altas dosis de diuréticos y en aquellos con evidencia de insuficien-

cia hepática). No es necesario ajuste de dosis en ancianos, en presencia de insuficiencia renal o de diálisis.

DISTRIBUCIÓN

Bajo Receta en Farmacias

CLASE TERAPEÚTICA

Sistema Cardiovascular - Hipotensores.

SIMPERTEN D

CHILE - MATHER COMPANY

Losartan, hidroclorotiazida

Antihipertensivo diurético

- 50 mg./12,5 mg. x 30 comp. rec.
- 100 mg./25 mg. x 30 comp. rec.

PRESENTACIÓN

Envase con 30 Comprimidos

INDICACIONES

Tratamiento de la hipertensión arterial en aquellos pacientes que no han respondido adecuadamente al tratamiento de Losartan potásico como droga única. No está indicado como tratamiento inicial en pacientes

con hipertensión intensa.

DOSIS

La dosis habitual de inicio y de mantención es de 1 comprimido en una toma matinal única, para la mayoría de los pacientes. Si al cabo de tres semanas los resultados no son satisfactorios, se puede aumentar la dosis hasta 2 comprimidos, una vez al día, la cual corresponde a la dosis máxima. No es necesario adaptar la dosis en pacientes geriátricos, en aquellos casos de insuficiencia renal o en pacientes sometidos a diálisis. Una dosis más reducida debe ser considerada en pacientes con insuficiencia hepática.

DISTRIBUCIÓN

Bajo Receta en Farmacias

CLASE TERAPEÚTICA

Sistema Cardiovascular - Hipotensores