

SINAC ANDROMACO

Adapalene

- 0,3% Gel x 30g.
- 0,1% Gel x 30g.

FÓRMULA:

SINAC 0.1%

Cada 100g. contiene: Adapalene 0,30g.; Excipientes (Fenoxietanol 0,25g.; Carbomer 1,10g.; Propilenglicol 5,00g.; Metilparabeno 0,10g.; EDTA Disódico 0,10g. Hidróxido de Sodio 0,15g. Poloxamer 0,20g.; Agua Purificada c.s.p. 100,00g.

SINAC 0.3%

Cada 100g. contiene: Adapalene 0,30g.; Excipientes (Fenoxietanol 0,25g.; Carbomer 1,10g.; Propilenglicol 5,00g.; Metilparabeno 0,10g.; EDTA Disódico 0,10g. Hidróxido de Sodio 0,15g. Poloxamer 0,20g.; Agua Purificada c.s.p. 100,00g.

INDICACIONES:

Sinac Gel, está indicado para el tratamiento tópico del acné vulgar de leve a moderado (comedones, pápulas y pústulas) que afecta el rostro, pecho y espalda.

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS/ PROPIEDADES:

Acción farmacológica: El Adapalene es un compuesto similar retinoide, con propiedades antiinflamatorias. Como la Tretinoína, se une a receptores nucleares del Ácido Retinoico, pero contrariamente a esta, no se une con la proteína transportadora de Ácido Retinoico.

Aplicado tópicamente es un modulador de la diferenciación celular, de la queratinización y de los procesos inflamatorios, fenómenos estos que se encuentran presentes en la patogenia del acné vulgar. Si bien se desconoce el mecanismo de acción del Adapalene, el mismo parecería inducir la diferenciación de las células epiteliales foliculares, lo que se traduciría en la menor formación de comedones.

El Adapalene demostró ser superior a los retinoides de referencia en pruebas antiinflamatorias estándar, tanto in vivo como in vitro. Inhibe las respuestas quimiotácticas y quimioquinas de los leucocitos polimorfonucleares, así como el metabolismo de lipooxidación del ácido Araquidónico, al producirse estímulos proinflamatorios. Este perfil sugiere que el componente inflamatorio celular del acné puede ser modificado por el Adapalene.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

ADVERTENCIAS:

Sinac 0,3% gel debe discontinuarse si se observa hipersensibilidad a alguno de los componentes.

Los pacientes con quemaduras solares no deberían usar el producto hasta su completa recuperación.

PRECAUCIONES:

Evitar el contacto con los ojos, párpados, boca u otras membranas mucosas, en caso de producirse, se recomienda lavar cuidadosamente las zonas afectadas con agua tibia. No debe aplicarse sobre la piel exzematosa o lastimada. Si se han utilizado recientemente preparaciones exfoliantes, se recomienda comenzar el tratamiento cuando la irritación de la piel mejore. Puesto que la exposición a la luz UV y al sol puede irritar aún más la piel, se recomienda evitarlos. Se aconseja el uso de pantallas solares y ropa que proteja las zonas tratadas, cuando no pudiera evitarse la exposición al sol. Si existe quemadura solar en el área acnéica, esperar hasta la recuperación total para comenzar el tratamiento con Adapalene. Evitar el uso de productos alcohólicos o fragancias con cosméticos astringentes o comedogénicos sobre el área a tratar. Se recomienda no aumentar la cantidad de medicamento aplicado ya que no mejora su actividad, no acelera su acción farmacológica y puede producir enrojecimiento, descamación e incomodidad. Ciertos signos y síntomas, tales como eritemas, resacamamiento o prurito pueden experimentarse durante el tratamiento. Los mismos pueden presentarse en las primeras semanas y, generalmente, disminuyen con el uso continuo de la medicación. El profesional indicará a los pacientes si deben reducir la frecuencia de aplicación o discontinuar el uso del producto.

INTERACCIONES:

No utilizar simultáneamente con otros retinoides. No se conocen interacciones con otros medicamentos tópicos y pueden emplearse con otras terapias antiacné, como Eritromicina 4%, Clindamicina 1%, o Peróxido de Benzoilo en concentraciones hasta el 10%, aplicados durante la mañana cuando se aplique Sinac 0,3% Gel por la noche. Si el paciente está utilizando cualquier otro medicamento debe ser consultado con el médico.

REACCIONES ADVERSAS:

Irritación cutánea enrojecimiento y calor. Estas acciones son reversibles si la aplicación es menos frecuente o se suspende.

SINAC PB ANDROMACO

Adapalene 0,1%. Peróxido de Benzoilo 2,5%

- Envase con 40 g

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

El Adapalene es un derivado del ácido naftoico, análogo retinoide, modulador de la proliferación y diferenciación celular, queratinización y procesos inflamatorios que posee efectos comedolíticos y anticomedogénicos.

El Peróxido de Benzoilo es un agente lipofílico, oxidante con actividad antimicrobiana y queratolítica.

INFORMACIONES

OPCIONALES:

COMPOSICIÓN, FÓRMULA:

Cada 100 g contiene: Peroxido de Benzoilo 2,500g; Adapalene 0,100g. Excipientes (Acrilamida/ Copolímero Acriloildimetilaurato de Sodio 1,500 g; Isohexadecano 0,900 g; Polisorbato 80 0,300g; Oleato de Sorbitán 0,100 g; Fenoxietanol 0,250 g; Poloxamer 182 0,200 g; Docusato de Sodio 0,050 g; Metilparabeno 0,100g; Propilenglicol 5,000g, EDTA Disódico 0,100 g; Agua purificada c.s.p 100,000 g)

INDICACIONES:

Sinac PB está indicado para el tratamiento tópico del acné vulgar de leve a moderado (comedones, pápulas y pústulas)

Contra indicaciones:

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula

DOSIFICACIÓN, MODO DE USO:

Aplicar una capa delgada de Sinac PB una vez por día (preferentemente por la noche) sobre la piel limpia y seca. Por lo general los primeros síntomas de mejoría se manifiestan al cabo de 1 a 4 semanas de iniciado el tratamiento. Sin embargo el médico determinará la duración del tratamiento según el estado clínico del paciente.