

SINDROLEN 50 AS-FARM**Diclofenac sódico***Analgésico, antiinflamatorio, antirreumático, antipirético*

• 50 mg. comp. rec. caja x 15

CONTRAINDICACIONES:

Pacientes con hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes de la formulación. Embarazo. Lactancia. Niños menores de 12 años. Pacientes con antecedentes de crisis asmáticas, urticaria y otras reacciones alérgicas con la administración de Aspirina u otros AINE. Úlcera gastroduodenal. Insuficiencia hepática o renal severa.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Los pacientes con trastornos gastrointestinales o con historia de úlcera péptica, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, con trastornos hematopoyéticos o de la coagulación así como los efectos de lesión hepática, cardíaca o renal grave, deberán ser mantenidos bajo estrecha vigilancia médica. Si se presenta una hemorragia gastrointestinal o un úlcus, debe suspenderse la medicación. En los pacientes sometidos a medicación durante tiempo prolongado, esta indicada como medida de precaución, realizar exámenes hepáticos periódicos y controlar las funciones hepática y renal. Se empleará con especial precaución en pacientes de edad avanzada, en aquellos que están bajo tratamiento con diuréticos y en los que se hallen en periodo de recuperación tras intervenciones quirúrgicas mayores. Los pacientes que experimenten vértigo y otros trastornos nerviosos centrales no deberán conducir automóviles, manejar maquinaria peligrosa y evitarán situaciones que precisen un estado especial en alerta. Retención hidrosalina y edemas: Diversos grados de retención hidrosalina incluso con edemas se ha observado en asociación con el uso de AINE, incluido el Diclofenac, por lo que se recomienda precaución, especialmente en pacientes con antecedentes de descompensación cardíaca, hipertensión y otra patología que predisponga a retención hidrosalina.

SINDROLEN CREMA AS-FARM**Diclofenac dietilamina, clorfeniramina maleato***Antiinflamatorio, analgésico, antirreumático percutáneo*

• Crema tópica x 50 gr.

CONTRAINDICACIONES:

Tuberculosis cutánea, dermatosis luéticas, herpes, varicela, viruela. En pacientes con sensi-

bilidad a uno de los componentes. En pacientes con deterioro circulatorio. Úlcera gastroduodenal contraindicando en pacientes en quienes el ácido acetilsalicílico y otros agentes inhibidores de la prostaglandina sintetasa desencadenen ataques de asma-urticaria-o rinitis aguda.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Deberá ser aplicada sobre la piel intacta. No aplicar sobre heridas abiertas, escoriaciones. Evitar acercarse o aplicar a los ojos o membranas o mucosas. Evitar uso simultáneo con otros productos en la zona de aplicación. Se tendrá especial atención en pacientes de edad avanzada, disminuyendo las dosis en ancianos de bajo peso, débiles o en aquellos que están con tratamiento diurético. No está indicada para uso oftálmico.

SINDROLEN 200 AS-FARM**Paracetamol***Analgésico, antifebril*

• Caja conteniendo frasco gotero x 15 mL

Envase Primario: Frasco gotero plástico PEAD color blanco, con inserto pico gotero blanco y con tapa gotero rosca inviolable blanco.

CONTRAINDICACIONES:

Está contraindicado en aquellos pacientes que han previamente presentado hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de su fórmula.

Enfermedades hepáticas, ingestión de anticoagulantes, trastornos de la coagulación, úlcera péptica activa.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Administre Paracetamol con cautela a los pacientes con anemia o enfermedad hepática o renal, porque se ha sabido que induce a esos trastornos; y a los pacientes con antecedentes de enfermedad gastrointestinal, aumento del riesgo de hemorragia gastrointestinal o disminución de la función renal. El paracetamol puede enmascarar los signos y síntomas de afección aguda (fiebre, mialgias, eritema); los pacientes con alto riesgo de infección (como los diabéticos) se valorarán cuidadosamente.

SINDROLEN 750 AS-FARM**Paracetamol***Analgésico, Antipirético*

• Blister x 10 comprimidos.

CONTRAINDICACIONES:

En pacientes con hipersensibilidad conocida al paracetamol. Administrar el fármaco con cautela a pacientes con anemia o enfermedad hepática o renal,

pacientes con enfermedad gastrointestinal. Evitar el uso de alcohol.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Utilice con precaución en pacientes alcohólicos, en pacientes con asma agudo, y en tratamientos con depresores del SNC, embarazo y lactancia

SINDROLEN GESIC AS-FARM**Paracetamol, diclofenac sódico***Analgésico Antiinflamatorio antirreumático, antipirético*

• Caja x 16 comp. recub.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a los componentes, úlcera péptica, insuficiencia cardíaca, hepática, renal grave. Embarazo y lactancia.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

En pacientes de edad avanzada. En pacientes sometidos a tratamientos prolongados, se deberán realizar recuentos hemáticos periódicos, controlar la función hepática y renal.