

Timolol**Antiglaucomatoso**

- Colirio 0,50 % x 10 mL.

COMPOSICIÓN

Cada mL de solución oftálmica estéril contienen:

Timolol (como maleato) 5,0 mg (0,50%).

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

TIOF es un bloqueador beta-adrenérgico no selectivo, para el tratamiento del glaucoma compite con las catecolaminas para ocupar los sitios del receptor beta simpático. Bloquea tanto receptores β_1 como β_2 .

TIOF no tiene actividad simpaticomimética intrínseca y posee gran seguridad cuando se administra por diferentes vías.

Cuando se aplica TIOF en forma tópica en el ojo, reduce tanto la presión intraocular elevada como la normal, asociada o no a glaucoma, sin afectar la acomodación o tamaño pupilar.

INDICACIONES

TIOF está indicado en glaucoma crónico de ángulo abierto, glaucoma afáquico y glaucoma secundario.

En pacientes con presión intraocular elevada, con riesgo suficiente como para requerir disminución de la presión intraocular.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Según indicación médica.

Dosis sugerida: En casos más severos, 1 gota de TIOF 0,50% en el ojo afectado dos veces al día.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a bloqueadores beta adrenérgicos. No utilizar en iritis aguda, en queratitis dendrítica y en pacientes con cirugía intraocular. Úlcera activa corneal, retinopatía diabética y glaucoma secundario.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

En pacientes asmáticos, con historia de asma bronquial o enfermedad pulmonar obstructiva

crónica.

En pacientes que reciben agentes betabloqueadores por la vía oral.

Evitar que la punta del gotario o pomo entre en contacto con la superficie del ojo.

REACCIONES ADVERSAS

En general es bien tolerado.

INTERACCIONES

No se han descrito.

SOBREDOSIFICACIONES

No se ha descrito.

ALMACENAJE

Almacenar por debajo de los 30°C. Protegido de la luz.

PRESENTACIÓN

TIOF: frasco gotario sellado con 10 mL de solución oftálmica estéril de TIOF 0,5 %.