

TRIM SAVAL

Maleato de trimebutina

Antiespasmódico espasmolítico regulador intestinal

- 300mg. Caja x 30 comp. rec. LP.

COMPOSICIÓN

Cada comprimido de liberación prolongada contiene:
Trimebutina Maleato 300mg

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

Se observa un significativo efecto de primer paso para esta droga, es decir, gran parte de la Trimebutina absorbida es transformada a un metabolito activo, la N-mono-desmetil trimebutina, antes de alcanzar la circulación sistémica. La formulación de acción prolongada tiene una vida media más larga. Las diferencias observadas para las constantes de eliminación y las vidas medias de eliminación se deben al hecho de que la fase de absorción de la formulación de acción prolongada persiste después que la fase de distribución ha terminado. Esto faculta la administración cada 12 horas.

INDICACIONES

Indicado en Síndrome de Intestino Irritable: colopatías funcionales, colon irritable, colon inestable, colon espástico, y sus manifestaciones como espasmos intestinales, disfunción cólica, crisis alternantes de diarrea y estreñimiento, meteorismo, do-

lor y distensión abdominal, constipación, secuelas de gastrectomía, dispepsias.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Vía Oral. Dosis usual: 1 comprimido de 300 mg, 2 veces al día (en la mañana y en la noche), durante un período mínimo de 20 días, administrado inmediatamente antes de las comidas.

CONTRAINDICACIONES

Trimebutina está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a la droga. No administrar en pacientes con miastenia gravis. No se recomienda su utilización durante el embarazo y lactancia. No usar en Fenilcetonuria.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Se recomienda instruir a pacientes sobre la propiedad anestésica de la mucosa bucal a fin de evitar que este se alarme innecesariamente. No se debe asociar con fármacos anticolinérgicos por ser antagonistas. Debe controlarse la aparición de leucopenia y los efectos adversos señalados. Administrar con precaución a pacientes con enfermedad hepática, cardíaca o renal, ajustando la dosis en caso necesario.

REACCIONES ADVERSAS

Trimebutina es bien tolerado. En forma aislada se ha reportado constipación, vómitos, rash cutáneo, cefalea, ligera hipotensión. Los pacientes más sensi-

bles pueden acusar cansancio, somnolencia o laseitud. Todos estos efectos adversos fueron benignos y reversibles al cesar la medicación.

INTERACCIONES

Al coadministrar procainamida con trimebutina puede resultar un efecto antivagal aditivo sobre la conducción nodal atrioventricular. Este efecto con procainamida no está bien documentado. No existe más información al respecto. No se debe asociar con fármacos anticolinérgicos por ser antagonistas.

SOBREDOSIFICACIONES

No se ha descrito.

ALMACENAJE

Almacenar a no más de 30 °C. Proteger de la luz y humedad.

PRESENTACIÓN

Envases con 30 comprimidos de liberación prolongada.